N° d'ordre 89

50376
1968
171

50376
1968
171

THESE DE 3^{ème} CYCLE
MATHÉMATIQUES PURES

VARIÉTÉS DIFFÉRENTIABLES MODÉLÉS SUR DES

ESPACES VECTORIELS QUASI-TOPOLOGIQUES

Thèse de M. Jean Claude DOUAI

1968

SCD LILLE 1

D 030 272692 2

50376
1968
171

50376
1968
-1-
171

Etant donné une catégorie $\mathcal{C}$, il n'existe pas en général de structure sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ qui en fasse un objet de $\mathcal{C}$ et pour laquelle les applications d'évaluation et de composition

$$(i) \quad \text{EV} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times X \longrightarrow Y$$

$$(f, x) \rightsquigarrow f(x)$$

$$(ii) \quad \bar{\Phi}_{X, Y, Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$$

$$(f, g) \rightsquigarrow g \circ f$$

sont des morphismes de $\mathcal{C}$.

Nous désignerons par $\mathcal{E}$ la catégorie dont les objets sont les espaces vectoriels topologiques réels $(E, F, G, \dots)$ et dont les morphismes sont les applications continues (non nécessairement linéaires) et par $\mathcal{L}(E, F)$ l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ des applications continues de E dans F .

Il n'est pas possible, en général, de munir canoniquement l'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$ d'une topologie telle que l'application de composition

$$\bar{\Phi}_{E, F, G} : \mathcal{L}(E, F) \times \mathcal{L}(F, G) \longrightarrow \mathcal{L}(E, G)$$

$$(f, g) \rightsquigarrow g \circ f$$

soit continue. De là, la difficulté à définir une notion d'application différentiable f de classe C^1 d'un ouvert U de E dans F

030 031656 9

possédant une différentielle $Df : U \rightarrow L(E, F)$ qui soit un morphisme en un sens convenable et qui vérifie le théorème de transitivité ponctuelle.

Dans un premier temps, nous sommes donc amené à généraliser la notion d'espace vectoriel topologique. Nous définissons un type de structure (dite quasi-topologique) dont peuvent se munir les espaces vectoriels réels de telle sorte que, si E et F sont des espaces vectoriels munis d'une telle structure, on ait les propriétés suivantes :

1°/ L'espace vectoriel des applications linéaires compatibles (en un sens à préciser) avec les structures est muni lui-même canoniquement d'une structure de la même espèce ;

2°/ L'application d'évaluation

$$\begin{array}{c} \backslash \\ L(E, F) \quad x \quad E \longrightarrow F \end{array}$$

est compatible avec les structures ;

3°/ Il en va de même de l'application de composition

$$\begin{array}{c} \Phi \\ \Phi_{E,F,G} : L(E,F) \quad x \quad L(F,G) \longrightarrow L(E,G) \\ (f, \quad g) \rightsquigarrow g \circ f \end{array}$$

Les conditions 1°, 2°, 3° sont liées à la notion de catégorie fermée au sens d'Antoine ([3] et [3] bis), notion qui est discutée au chapitre I. La catégorie $\tilde{T}$ des espaces quasi-topologiques et celle $\tilde{E}$ des espaces vectoriels (réels) quasi-topologiques sont des exemples de catégories fermées. La catégorie T des espaces

topologiques (resp. celle $\bar{E}$ des espaces vectoriels topologiques) se plonge comme sous-catégorie pleine dans la catégorie $\tilde{\mathcal{F}}$ (resp. dans la catégorie $\tilde{E}$). Les morphismes de $\tilde{\mathcal{F}}$ (resp. de $\tilde{E}$) sont appelés applications quasi-continues; ils généralisent les applications continues.

Par rapport au mémoire de A. Bastiani [4], notre notion d'espace vectoriel quasi-topologique est légèrement plus générale, car nous n'exigeons pas de condition de convexité locale. D'autre part, pour tout objet de $\tilde{E}$, nous démontrons l'existence d'une topologie localement convexe, dite sous-jacente à la quasi-topologie, pour laquelle tout filtre quasi-convergent converge. On notera que dans le travail [4] de A. Bastiani cette condition est imposée avec, en plus, une condition de séparation.

Comme l'a montré A. Bastiani, la notion de différentiabilité s'étend aux espaces vectoriels quasi-topologiques. Ceci nous permet de généraliser les applications de classe C^r entre espaces de Banach en introduisant la notion d'applications de classe D^r entre espaces vectoriels quasi-topologiques. Si $\tilde{E}^r$ désigne la catégorie dont les objets sont les espaces vectoriels quasi-topologiques et dont les morphismes sont les applications de classe D^r , nous montrons que les ensembles $\text{Hom}_{\tilde{E}^r}(E, F)$ se munissent canoniquement d'une quasi-topologie notée δ_r telle que

1°/ Les applications (i) et (ii) sont les morphismes dans les cas $r = 0$ et $r = \infty$ (catégories fermées).

2°/ L'application (i) est un morphisme dans tous les cas (catégories ~~fermées~~ fermées).

semi-

Il est alors aisé d'introduire la notion de variété de classe D^r modelée sur un espace vectoriel (réel) quasi-topologique et, parallèlement, la notion de structure fibrée de classe D^r qui se prête à l'étude de suites exactes. Soit $\tilde{\mathcal{V}}^r$ la catégorie dont les

objets sont des variétés de classe D^r modelées sur des espaces vectoriels quasi-topologiques séparés et dont les morphismes sont les applications de classe D^r . Pour décrire la structure de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}^{\sim}(X, Y)$, nous introduisons une nouvelle notion, celle de quasi-variété différentiable, ce qui permet, sous certaines hypothèses, de généraliser les résultats d'Abraham, Smale et Palais en munissant $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}^{\sim}(X, Y)$ d'une structure de quasi-variété de classe D^r .

La catégorie $\mathcal{V}^r$, dont les objets sont les variétés banachiques de classe C^r et les morphismes les applications de même classe, est canoniquement une sous-catégorie non pleine de $\tilde{\mathcal{V}}^r$. Cependant, si la variété source X est de dimension finie et si Y est un objet quelconque de $\mathcal{V}^r$, l'ensemble $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$ coïncide avec l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$. En particulier, si X est compacte et si Y possède une fonction exponentielle de classe suffisante, l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ admet, pour $r < \infty$, une structure de variété différentiable banachique (voir le cours [1] de Smale par Abraham). Nous établissons en outre au chapitre VI que, sous les mêmes hypothèses, l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, Y)$ admet une structure de variété de classe D^∞ modelée sur un espace de Fréchet.

CHAPITRE PREMIER

SEMÉ-
NOTION DE CATEGORIE FERMEE (RESP. ~~SEMÉ~~ FERMEE)

1 - Nous utiliserons dans la suite des catégories d'ensemble structurées (on dira encore c.e.s.) c'est-à-dire des couples $(\mathcal{C}, V)$ formés d'une catégorie $\mathcal{C}$ et d'un foncteur fidèle de $\mathcal{C}$ dans la catégorie des ensembles vérifiant les axiomes ([2] p. 1389-1392) :

⊗ Si $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X$ sont deux morphismes de $\mathcal{C}$ tels que $VX = VY = A, Vf = Vg = 1_A$, alors X et Y coïncident dans $\mathcal{C}$.

⊕ Soient X un objet de $\mathcal{C}$, A l'ensemble VX , B un ensemble quelconque et φ une bijection de A sur B , alors il existe un objet Y de $\mathcal{C}$ et un isomorphisme $f : X \rightarrow Y$ tel que $VY = B, Vf = \varphi$.

Nous considérons les catégories d'ensembles structurés suivantes : $(T, V), (\mathcal{V}^r, V), (E, V) \dots \dots$, où T désigne la catégorie des espaces topologiques, E celle des espaces vectoriels topologiques, toutes deux admettant pour morphismes les applications continues, $\mathcal{V}^r$ la catégorie des variétés de Banach de classe C^r dont les morphismes sont les applications de classe C^r . Le foncteur V sera toujours le foncteur oublié.

L'ensemble VX sera appelé ensemble sous jacent à l'objet X de $\mathcal{C}$; si f est un morphisme de X dans Y , l'application $Vf : VX \rightarrow VY$ sera appelée morphisme sous jacent à f .

Proposition 2.2. : Sous les conditions de la définition 2.1., la transformation naturelle λ^u est injective.

Le diagramme suivant est, en effet, commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, U) & \xrightarrow{\lambda^u} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z \times X, Y) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Hom}_{\text{Ens}}(VZ, VU) & \xrightarrow{\quad} & \text{Hom}_{\text{Ens}}(VZ \times VX, VY) \\
 \downarrow & & \parallel \\
 \text{Hom}_{\text{Ens}}(VZ, \text{Hom}_{\text{Ens}}(VX, VY)) & \xrightarrow{\lambda^{E_V}} & \text{Hom}_{\text{Ens}}(VZ \times VX, VY)
 \end{array}$$

Comme toutes les flèches verticales et la flèche λ^{E_V} sont injectives, il en est donc de même de λ^u .

Définition 2.3. : S'il existe sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ une structure privilégiée pour laquelle la transformation λ^u est bijective, nous dirons que $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ possède une structure canonique.

L'ensemble structuré correspondant U de $\mathcal{C}$ sera appelé "ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ muni de sa structure canonique".

Proposition 2.4. : S'il existe une structure canonique sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, cette dernière est unique.

Supposons, en effet, qu'il existe deux bonnes structures sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. Il existe alors deux ensembles structurés U et U' dans $\mathcal{C}$ tels que $V(U) = V(U') = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ et deux morphismes

$$\begin{array}{ccc}
 u : U \times X & \longrightarrow & Y \\
 u' : U' \times X & \longrightarrow & Y
 \end{array}$$

tels que $V(u) = V(u')$ soit la restriction de l'application d'évaluation ensembliste à $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. Au morphisme u, il correspond une bijection λ^u telle que le morphisme

$$(\lambda^u)^{-1}(u') : U' \longrightarrow U$$

admette pour application sous jacente l'application identité de $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$. De la même façon, il correspond au morphisme u' une autre bijection $\lambda^{u'}$ telle que

$$(\lambda^{u'})^{-1}(u) : U \longrightarrow U'$$

admette la même application sous jacente que $(\lambda^u)^{-1}(u')$. La condition $\textcircled{\alpha}$ de 1 entraîne alors $U = U'$.

Il n'y a pas de résultat semblable pour les structures privilégiées.

3 - Un exemple

Considérons la catégorie d'ensembles structurés (T, V) . Du théorème 3.1. suivant ([6] p.45), il résulte que la topologie de la convergence compacte est une structure privilégiée sur $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ si X est localement compact.

Théorème 3.1. : Si X est localement compact, la topologie de la convergence compacte est la topologie la moins fine pour laquelle l'application d'évaluation $u : (g, x) \longrightarrow g(x)$ de $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y) \times X$ dans Y est continue.

Si X est localement compact et $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ muni de la topologie de la convergence compacte, à une application $f : Z \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ continue, il correspond donc une application

$$\lambda^u(f) : Z \times X \xrightarrow{f \times \text{id}_X} \text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y) \times X \xrightarrow{u} Y$$

qui est, elle aussi, continue.

On a même le résultat suivant [6] qui assure, toujours sous l'hypothèse X localement compact, que la topologie de la convergence compacte est, en fait, une structure canonique c'est à dire que l'application λ^u est bijective.

Théorème 3.2. : Soient Z, X, Y trois espaces topologiques, $\bar{f}$ une application de $Z \times X$ dans Y . Si $\bar{f}$ est continue, $f : z \longrightarrow \bar{f}(z, \cdot)$ est une application continue de Z dans $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ muni de la topologie de la convergence compacte.

4 - Plongement d'une c.e.s. dans une c.e.s. fermée

Ce qui suit reprend la partie qui nous intéresse le plus dans l'article [3 - 3bis] d'Antoine (voir les pages 387 à 39.). Nous espérons avoir simplifié les notations.

Si $(\mathcal{E}, V)$ et $(\mathcal{E}', V')$ désignent deux catégories d'ensembles structurés, on appellera, dans ce paragraphe foncteur de $(\mathcal{E}, V)$ dans $(\mathcal{E}', V')$ un foncteur de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{E}'$ qui commute avec V et V' .
Définition 4.1. Une catégorie d'ensembles structurés $(\mathcal{E}, V)$ sera dite semi-fermée (resp. fermée) si pour tout couple (X, Y) d'objets de $\mathcal{E}$, il existe une structure privilégiée (resp. canonique) sur $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$.

Ex. : le couple $(\text{Ens}, \text{id}_{\text{Ens}})$ constitue une c.e.s. fermée

Définition 4.2. Nous dirons que $(\mathcal{E}, V)$ contient les morphismes constants si, pour tout couple (X, Y) d'objets de $\mathcal{E}$, toute application constante de VX dans VY est sous jacente à un morphisme de X dans Y .

Nous supposerons dans la suite que toutes les c.e.s. contiennent les morphismes constants ; c'est le cas de $(\mathbb{T}, V)$, $(\mathbb{E}, V)$, $(\mathbb{V}^r, V)$.

Proposition 4.3. Toute c.e.s. fermée $(\mathcal{E}, V)$ contient les morphismes constants.

Notons $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ muni de sa structure canonique (il en sera ainsi dans la suite). A tout morphisme de $Z \times X$ dans Y il correspond un morphisme de Z dans $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ pour tout $Z \in \mathcal{O}\mathcal{E}\mathcal{B}$.

Faisons $Z = Y$; à la projection

$$\bar{\pi}_1 : Y \times X \longrightarrow Y ,$$

Il correspond un morphisme

$$\begin{array}{ccc} \pi_2 : Y & \longrightarrow & \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{E}}(X, Y) \\ & \searrow \omega & \cup \\ & & \pi_1(y) \end{array}$$

tel que, pour tout $y \in Y$ fini, $\pi_1(y)(x) = y$. Le morphisme

$\pi_1(y)$ est donc un morphisme constant.

Posons $\hat{\mathcal{C}} = \underline{\text{Hom}}_{\text{Cat}} (\mathcal{C}^\circ, \underline{\text{Ens}})$; soit $h_\bullet$ le foncteur

canonique pleinement fidèle défini par

$$h_\bullet : \mathcal{C} \longrightarrow \hat{\mathcal{C}}$$

$$X \rightsquigarrow h_X = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bullet, X).$$

Intéressons-nous à la sous-catégorie de $\hat{\mathcal{C}}$ formée des foncteurs H_E définis comme suit

$$H_E : \mathcal{C}^\circ \longrightarrow \underline{\text{Ens}}$$

$$X \rightsquigarrow \text{Hom}_{\underline{\text{Ens}}} (VX, E), \text{ sur les objets}$$

$$\begin{array}{ccc} X & H_E(X) \ni \varphi \circ \forall f & \\ f \downarrow & \uparrow H_E(f) & , \text{ sur les morphismes.} \\ Y & H_E(Y) \ni \varphi & \end{array}$$

Appelons $\hat{\mathcal{E}}$ la sous-catégorie pleine de $\hat{\mathcal{C}}$ dont les objets sont, pour tout ensemble E , les sous-foncteurs F de H_E contenant le sous-foncteur K_E défini comme suit

$$K_E : \mathcal{C}^\circ \longrightarrow \underline{\text{Ens}}$$

$$X \rightsquigarrow K_E(X) = \text{Ensemble des applications constantes de } VX \text{ dans } E.$$

Pour tout objet X de $\mathcal{C}$, on a donc

$$K_E(X) \subset F(X) \subset H_E(X) = \text{Hom}_{\underline{\text{Ens}}} (VX, E).$$

Il existe un foncteur $\hat{V}' : \hat{\mathcal{C}}' \longrightarrow \underline{\text{Ens}}$ qui associe l'ensemble E à l'objet F de $\hat{\mathcal{C}}'$. Sa définition sur les flèches de $\hat{\mathcal{C}}'$ se fait comme suit. Soient $K_E \subset F \subset H_E, K_E \subset F' \subset H_E$, et $\lambda : F \rightarrow F'$ une transformation naturelle. Nous avons le diagramme commutatif suivant:

$$\begin{array}{ccccc} X & & F(X) & \xrightarrow{\lambda^X} & F'(X) \\ f \downarrow & & \uparrow F(f) & & \uparrow F'(f) \\ Y & & F(Y) & \xrightarrow{\lambda^Y} & F'(Y). \end{array}$$

Donc, si a_X (resp a_Y) désigne l'application constante de VX (resp VY) dans E qui prend la valeur a , nous avons aussi le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} VX & \xrightarrow{\lambda^{X(a_X)}} & E' \\ \downarrow Vf & & \\ VY & \xrightarrow{\lambda^Y(a_Y)} & E' \end{array}$$

Si Vf est une application quelconque constante, $\lambda^{X(a_X)}$ et $\lambda^Y(a_Y)$ sont constantes et prennent la même valeur a' . Par définition, on prendra pour application $\hat{V}'(\lambda)$ de E dans E l'application $a \rightarrow a'$.

Le foncteur V' ainsi construit est fidèle. En effet, soit f un morphisme de X dans Y tel que Vf soit l'application constante de VX dans VY de valeur y . Nous avons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & \varphi & & \\ & & \cap & & \\ & & F(Y) & \xrightarrow{\lambda^Y} & F'(Y) \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ f & \uparrow & F(f) & & F'(f) \\ & & F(X) & \xrightarrow{\lambda^X} & F'(X) \\ & & \cup & & \cup \\ & & F(f)(\varphi) & & F'(f)(\lambda^Y(\varphi)) \end{array}$$

$F(f)(\varphi)$ est l'application constante de VX dans E de valeur $\varphi(y)$, $F'(f)(\lambda^Y(\varphi))$ l'application constante de VX dans E' de valeur $\lambda^Y(\varphi)(y)$. Donc, pour tout $y \in VY$, $\lambda^Y(\varphi)(y)$ est l'image par $\hat{V}'(\lambda)$ de $\varphi(y)$, d'où : $\hat{V}'(\lambda)(\varphi(y)) = \lambda^Y(\varphi)(y)$ et la fidélité de $\hat{V}'$.

Nous avons, d'autre part, les injections suivantes si $E = VY$:

$$K_{VY}(X) = K_E(X) \hookrightarrow h_Y(X) \hookrightarrow \text{Hom}_{\underline{\text{Ens}}}(VX, VY) = H_{VY}(VX).$$

h_Y est donc un sous foncteur de H_{VY} qui contient K_E .

Autrement dit, pour tout objet Y de $\mathcal{C}$, le foncteur h_Y est un objet de $\hat{\mathcal{C}}'$. On définit donc un foncteur

$$\bar{h} : \mathcal{C} \longrightarrow \hat{\mathcal{C}}'$$

en posant $\bar{h}_Y = h_Y$ et on a, dès lors, la factorisation

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{h} & \hat{\mathcal{C}} \\ & \searrow \bar{h} & \uparrow \\ & & \hat{\mathcal{C}}' \end{array}$$

Proposition 4.4. : Le foncteur $\bar{h}$ est un foncteur pleinement fidèle qui commute aux produits finis.

Proposition 4.5. : Le couple $(\hat{\mathcal{C}}', \hat{V}')$ est une c.e.s. possédant les morphismes constants et admettant des produits auxquels V' commute. Le foncteur $\bar{h} : \mathcal{C} \rightarrow \hat{\mathcal{C}}'$ induit un foncteur que nous noterons encore $\bar{h}$ de la c.e.s. $(\mathcal{C}, V)$ dans la c.e.s. $(\hat{\mathcal{C}}', \hat{V}')$. $\bar{h}$ commute aux structures canoniques qui existent éventuellement dans la c.e.s. $(\mathcal{C}, V)$.

De cette proposition, nous ne démontrerons que la dernière partie. Soit un couple (X, Y) d'objets de $\mathcal{C}$ tel qu'il existe une structure canonique sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$; soit $U = \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ l'objet correspondant de $\mathcal{C}$. $\bar{h}$ étant pleinement fidèle, $\text{Hom}_{\hat{\mathcal{C}}'}(\bar{h}_X, \bar{h}_Y)$ est isomorphe à $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. Démontrons alors que $\bar{h}_U$ est l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bar{h}_X, \bar{h}_Y)$ muni de sa structure canonique, c'est à dire que

$$\bar{h}_U = \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{C}}(\bar{h}_X, \bar{h}_Y)$$

Or, c'est une conséquence des points a), b), c) ci-dessous:

a) $\bar{h}_U$ est un objet de $\hat{\mathcal{C}}'$.

b) le morphisme $u : U \times X \rightarrow Y$ dans $\mathcal{C}$ (Cf. 2) induit un morphisme $\bar{h}_u : \bar{h}_{U \times X} \rightarrow \bar{h}_Y$ dans $\hat{\mathcal{C}}'$. Or $\bar{h}$ commute avec les produits finis et

$$\bar{h}_u : \bar{h}_U \times \bar{h}_X \longrightarrow \bar{h}_Y$$

est un morphisme de $\hat{\mathcal{C}}'$ tel que $\hat{V}'(\bar{h}_u)$ coïncide avec la restriction de l'application d'évaluation à $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times X$. $\bar{h}_U$ est ainsi une structure privilégiée sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bar{h}_X, \bar{h}_Y)$.

c) Soit un morphisme de $\hat{\mathcal{C}}'$

$$\mu : \bar{h}_Z \times \bar{h}_X \approx \bar{h}_{Z \times X} \longrightarrow \bar{h}_Y.$$

μ est induite par un morphisme de $Z \times X$ dans Y auquel correspond dans $\mathcal{C}$ un morphisme de Z dans $\underline{\text{Hom}}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ qui induit lui-même dans $\hat{\mathcal{C}}'$ un morphisme de $\bar{h}_Z$ dans $\bar{h}_U$. $\bar{h}_U$ est ainsi l'ensemble $\text{Hom}(\bar{h}_X, \bar{h}_Y)$ muni de sa structure canonique.

Proposition 4.6. : la c.e.s. $(\hat{\mathcal{C}}', \hat{V}')$ est une c.e.s. fermée.

Soient F et G deux objets de $\hat{\mathcal{C}}'$. Nous allons munir $\text{Hom}_{\hat{\mathcal{C}}'}(F, G)$ d'une structure canonique. L'objet obtenu dans $\hat{\mathcal{C}}'$ doit être un sous foncteur de $H_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}}(F, G)$.

Pour tout objet X de $\mathcal{C}$, considérons donc le sous ensemble $U(X) \subset H_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}}(F, G)(X)$ des applications

$\lambda : \hat{V}'(\bar{h}_X) = VX \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, G)$ telles que l'application correspondante de $VX \times \hat{V}' F$ dans $\hat{V}' G$ soit sous jacente à un morphisme de $\hat{\mathcal{C}}'$. Le lecteur vérifiera que $U : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$ est un objet de $\hat{\mathcal{C}}'$ et que sa structure est structure canonique pour l'ensemble $\underline{\text{Hom}}_{\hat{\mathcal{C}}'}(F, G)$ (cf. la démonstration de la proposition 4.5.).

Soient :

- $\hat{\mathcal{C}}_0$ la sous catégorie pleine de $\hat{\mathcal{C}}'$ dont les objets sont isomorphes aux $\bar{h}_X$ pour $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$.
- $\hat{\mathcal{C}}_1^*$ la sous catégorie pleine de $\hat{\mathcal{C}}'$ dont les objets sont ceux de $\hat{\mathcal{C}}_0$ ainsi que, pour tout couple (F, G) d'objets de $\hat{\mathcal{C}}_0$, les objets de $\hat{\mathcal{C}}_1^*$ isomorphes à $\underline{\text{Hom}}_{\hat{\mathcal{C}}'}(F, G)$.
- $\hat{\mathcal{C}}_2$ la sous catégorie pleine de $\hat{\mathcal{C}}'$ dont les objets sont les produits finis dans $\hat{\mathcal{C}}'$ d'objets de $\hat{\mathcal{C}}_1^*$.

Par récurrence, on construit ainsi une suite de sous catégories $\hat{\mathcal{C}}_{2n}$ emboîtées dans $\hat{\mathcal{C}}'$.

$(\hat{\mathcal{C}}_{2n}, \hat{V}_{2n}) = (\hat{\mathcal{C}}_{2n}, V' | \hat{\mathcal{C}}_{2n})$ est pour tout n une c.e.s.

Si $\tilde{\mathcal{C}}$ est la réunion des $\hat{\mathcal{C}}_{2n}$, $(\tilde{\mathcal{C}}, \tilde{V}) = (\tilde{\mathcal{C}}, \hat{V}' | \tilde{\mathcal{C}})$ est une c.e.s. admettant des produits finis.

Le foncteur $\tilde{h}$ se factorise comme suit :

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathcal{C}, V) & \xrightarrow{\tilde{h}} & (\hat{\mathcal{C}}, \hat{V}') \\
 & \searrow \tilde{h} & \uparrow \\
 & & (\tilde{\mathcal{C}}, \tilde{V})
 \end{array}$$

où le foncteur $\tilde{h}$ est pleinement fidèle et commute aux structures canoniques qui existent éventuellement dans $(\mathcal{C}, V)$.

La c.e.s. $(\tilde{\mathcal{C}}, \tilde{V})$ est fermée car si F et G sont deux objets de $\tilde{\mathcal{C}}$, il existe un indice n tel que F et G soient objets de $\hat{\mathcal{C}}_{2n}$, alors $\underline{\text{Hom}}_{\tilde{\mathcal{C}}}(F, G) = \underline{\text{Hom}}_{\hat{\mathcal{C}}_{2n+1}}(F, G)$ est l'ensemble $\text{Hom}_{\hat{\mathcal{C}}}(F, G)$ muni de sa structure canonique.

Théorème 4.7. : Etant donné une catégorie d'ensembles structurés $(\mathcal{C}, V)$, il existe un plongement pleinement fidèle

$$\tilde{h} : (\mathcal{C}, V) \longrightarrow (\tilde{\mathcal{C}}, \tilde{V})$$

satisfaisant aux conditions suivantes :

(a) $(\tilde{\mathcal{C}}, \tilde{V})$ est une catégorie d'ensembles structurés fermée et possédant des produits finis.

(b) le plongement $\tilde{h}$ commute aux structures canoniques.

(c) il est universel dans le sens suivant : pour tout plongement pleinement fidèle $k : (\mathcal{C}, V) \longrightarrow (\mathcal{C}', V')$ vérifiant les propriétés analogues à (a) et (b), il existe un et un seul foncteur $(\tilde{\mathcal{C}}, \tilde{V}) \longrightarrow (\mathcal{C}', V')$ rendant commutatif le triangle

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathcal{C}, V) & \xrightarrow{\tilde{h}} & (\tilde{\mathcal{C}}, \tilde{V}) \\
 & \searrow k & \downarrow \\
 & & (\mathcal{C}', V')
 \end{array}$$

5 - Propriétés des catégories d'ensembles structurés fermées

Rappelons que la notation $\underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(\cdot, \cdot)$ est utilisée pour caractériser l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \cdot)$ muni de sa structure canonique dans une catégorie fermée.

$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbb{Z}, \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(X, Y))$ est isomorphe dans les ensembles à $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathbb{Z} \times X, Y)$. On a alors le résultat suivant plus précis.

Proposition 5.1. : $\underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(\mathbb{Z}, \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(X, Y))$ est isomorphe (dans la catégorie $\mathcal{C}$) à $\underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(\mathbb{Z} \times X, Y)$.

C'est une conséquence de l'axiome β de 1.

Proposition 5.2. : L'application

$$\begin{aligned} \Phi_{X, Y, Z} : \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) &\longrightarrow \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (g, f) &\longmapsto g \circ f \end{aligned}$$

est un morphisme de $\mathcal{C}$.

En effet, l'application

$$\begin{aligned} \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times X &\longrightarrow Z \\ (g, f, x) &\longmapsto (g \circ f)(x) \end{aligned}$$

est un morphisme de $\mathcal{C}$ puisqu'elle se factorise comme suit :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times X & \xrightarrow{\quad} & Z \\ \downarrow \text{id}_{\underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(Y, Z)} \times u & \searrow u & \\ \underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times Y & & \end{array}$$

où l'on a désigné par u l'application $\underline{\mathcal{H}om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times X \rightarrow Y$ qui admet pour application sous-jacente $V(u)$ la restriction de l'application d'évaluation. En vertu de la proposition 5.1., il lui correspond donc un morphisme

$$(g, f) \longmapsto g \circ f$$

de $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ qui coïncide avec l'application $\Phi_{X, Y, Z}$.

C'est cette proposition 5.2. qui jouera un rôle prépondérant dans le chapitre II - § II.

Définissons les deux foncteurs suivants de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}$, pour tout objet fixé X de $\mathcal{C}$, par

$$S^X : Z \rightsquigarrow S^X(Z) = Z \times X$$

$$R^X : Y \rightsquigarrow R^X(Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y).$$

Proposition 5.3. : Les deux foncteurs S^X et R^X sont adjoints, R^X adjoint à droite de S^X (ou S^X adjoint à gauche de R^X).

On a, en effet, l'isomorphisme suivant qui traduit l'adjonction

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(S^X(Z), Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, R^X(Y))$$

En particulier R^X commute aux limites gauches et est exact à gauche, pourvu que, dans $\mathcal{C}$, il existe une notion de suite exacte.

CHAPITRE DEUXIEME

NOTION DE QUASI-TOPOLOGIE ET DE DIFFERENTIABILITE
DANS LA CATEGORIE DES ESPACES VECTORIELS QUASI-TOPOLOGIQUES

I - Notion de Quasi-topologie

1 - Si $\mathcal{X}$ et $\mathcal{X}'$ désignent des filtres sur un ensemble X ,
 $\mathcal{X}' < \mathcal{X}$ signifiera dans la suite " $\mathcal{X}'$ plus fin que $\mathcal{X}$ ".

Définition 1.1. : Un ensemble X sera appelé espace quasi-topologique si, à chaque point $x \in X$, on a associé une famille $\prod(x)$ de filtres de X satisfaisant les conditions suivantes :

a) pour tout $x \in X$, $[x] \in \prod(x)$ où $[x]$ est le filtre formé de tous les ensembles contenant le point x .

b) si $\mathcal{X}' < \mathcal{X}$ et $\mathcal{X} \in \prod(x)$, alors $\mathcal{X}' \in \prod(x)$.

c) si $\mathcal{X} \in \prod(x)$ et $\mathcal{X}' \in \prod(x)$, alors $\mathcal{X} \cup \mathcal{X}' \in \prod(x)$,
 $\mathcal{X} \cup \mathcal{X}'$ désignant le filtre engendré par les ensembles $\xi \cup \xi'$
 $\xi \in \mathcal{X}, \xi' \in \mathcal{X}'$. On notera encore $\mathcal{X} \pi_x$ la relation d'appartenance
 $\mathcal{X} \in \prod(x)$ et on dira que le filtre $\mathcal{X}$ quasi-converge vers x .

Une telle relation est appelée quasi-topologie sur X ; un espace quasi-topologique est donc la donnée d'un couple (X, π_X) où X est un ensemble et π_X une quasi-topologie.

Si $\mathcal{X} \pi_x$ et $\mathcal{X}' \pi_x$ entraînent $x = x'$, on dira que l'espace quasi-topologique est séparé.

Considérons un autre couple (X, π'_X) où π'_X est une quasi-topologie sur X telle que $\mathcal{X} \pi_x \Rightarrow \mathcal{X} \pi'_x$; on dira alors que π'_X est moins fine que π_X .

Toute topologie sur X engendre une quasi-topologie : si τ_x est une topologie sur X , la relation " $\mathcal{X} \tau_x$ si et seulement si $\mathcal{X}$ converge vers x " est une quasi-topologie.

Définition 1.2. : Etant donné deux espaces quasi-topologiques (X, π_X) et $(X', \pi_{X'})$, on dira que l'application $f : X \longrightarrow X'$ est quasi-continue en x si la relation $\mathcal{X} \pi_X x$ entraîne $f(\mathcal{X}) \pi_{X'} f(x)$ où $f(\mathcal{X})$ est le filtre engendré par l'image du filtre $\mathcal{X}$ par f .

Si f est quasi-continue en tout point x de X , on dira que f est quasi-continue sur X .

Si X' est un sous-ensemble d'un espace quasi-topologique (X, π_X) , on définit sur X' une quasi-topologie $\pi_X | X'$ par la condition que l'injection $X' \longrightarrow X$ soit quasi-continue.

La composée de deux applications quasi-continues est quasi-continue. Nous pouvons donc considérer la catégorie $\widetilde{\mathcal{T}}$ des espaces quasi-topologiques dont les morphismes sont les applications quasi-continues. Dans $\widetilde{\mathcal{T}}$, un isomorphisme f est une application biunivoque quasi-continue telle que f^{-1} soit aussi quasi-continue ; on dira encore que f est un quasi-homéomorphisme.

La catégorie $\mathcal{T}$ des espaces topologiques est une sous-catégorie pleine de $\widetilde{\mathcal{T}}$.

La catégorie $\widetilde{\mathcal{T}}$ est une catégorie avec produits. Si

$\left\{ (X_i, \pi_{X_i}) \right\}_{i \in I}$ est une famille d'espaces quasi-topologiques,

on définit sur $\prod_{i \in I} X_i$ une quasi-topologie (dite produit et

notée $\prod_{i \in I} \pi_i$) par la condition :

" $\mathcal{X} \prod_{i \in I} \pi_i x$ si et seulement si $\mathcal{X}_i \pi_i x_i$ pour tout

$i \in I$ ", $\mathcal{X}_i$ (resp. x_i) désignant la projection du filtre $\mathcal{X}$ (resp. de x) sur X_i . On vérifie facilement les conditions a), b), c) de la définition 1 - 1.

Soient X, Y, Z des espaces quasi-topologiques et f une application quasi-continue de $X \times Y$ dans Z . Les applications

$$x \longrightarrow (x, y_0) \longrightarrow f(x, y_0) \text{ de } X \text{ dans } Z,$$

$y \longrightarrow (x_0, y) \longrightarrow f(x_0, y)$ de Y dans Z , associés respectivement à un point $y_0 \in Y, x_0 \in X$ sont chacune quasi-continue comme composées de deux applications quasi-continues.

2. Définition 2.1. : Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Une quasi-topologie π_E sur E sera dite compatible avec la structure vectorielle si les applications

$$(i) \quad (v, v') \longrightarrow v + v'$$

$$(ii) \quad (t, v) \longrightarrow t \cdot v$$

où $v, v' \in E, t \in \mathbb{R}$ sont des applications quasi-continues de $(E \times E, \pi_E \times \pi_E)$ dans (E, π_E) et de $(\mathbb{R} \times E, \pi_{\mathbb{R}} \times \pi_E)$ dans (E, π_E) respectivement.

Un espace vectoriel muni d'une quasi-topologie compatible avec la structure vectorielle sera appelé espace vectoriel quasi-topologique.

Si $(E_i)_{i \in I}$ est une famille d'espaces vectoriels quasi-topologiques, la quasi-topologie produit sur $\prod_{i \in I} E_i$ est compatible avec la structure vectorielle de $\prod_{i \in I} E_i$. Plus généralement, soient E un espace vectoriel, $(E_i)_{i \in I}$ une famille d'espaces vectoriels quasi-topologiques et $(f_i)_{i \in I}$ une famille d'applications linéaires de E dans E_i , la quasi-topologie sur E définie comme la quasi-topologie la moins fine rendant quasi-continues toutes les applications f_i est une quasi-topologie compatible avec la structure vectorielle de E (quasi-topologie initiale).

Définition 2.2. : Etant donné un espace vectoriel quasi-topologique (F, π_F) et (X, π_X) un espace quasi-topologique, on appellera quasi-topologie de la convergence locale sur $\text{Hom}_T(X, F)$ la quasi-topologie λ définie par :

" $\mathcal{F} \lambda f$ si et seulement si $\mathcal{X} \pi_X x$ entraîne $\mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F f(x)$ "
 où $\mathcal{F}$ est un filtre sur $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, F)$ et $\mathcal{F}(\mathcal{X})$ le filtre sur F admettant
 pour base les ensembles $\bigcup_{f \in \mathcal{F}} f(\xi)$ où $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$ et $\xi \in \mathcal{X}$.

Muni de cette quasi-topologie, $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, F)$ sera noté
 $\mathcal{H}_{\text{om}_{\mathcal{F}}}(X, F)$; cette notation sera justifiée par les théorèmes 2.8 et
 3.1.

Théorème 2.3. : La quasi-topologie de la convergence locale sur
 $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, F)$ est compatible avec la structure vectorielle.

Vérifions les conditions (i) et (ii). Soient $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$
 deux filtres de $\mathcal{H}_{\text{om}_{\mathcal{F}}}(X, F)$ quasi-convergentes respectivement vers
 f et f' ; établissons la relation : $(\mathcal{F} + \mathcal{F}') \lambda (f + f')$.

$$\mathcal{F} \lambda f \iff (\mathcal{X} \pi_X x \implies \mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F f(x))$$

$$\mathcal{F}' \lambda f' \iff (\mathcal{X} \pi_X x \implies \mathcal{F}'(\mathcal{X}) \pi_F f'(x)).$$

Or, puisque F est un espace vectoriel quasi-topologique,

$$(\mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F f(x), \mathcal{F}'(\mathcal{X}) \pi_F f'(x)) \implies (\mathcal{F}(\mathcal{X}) + \mathcal{F}'(\mathcal{X})) \pi_F (f(x) + f'(x))$$

Donc $\mathcal{F} \lambda f, \mathcal{F}' \lambda f'$ entraînent la relation :

$$\mathcal{X} \pi_X x \implies (\mathcal{F} + \mathcal{F}')(\mathcal{X}) \pi_F (f + f')(x)$$

et cette dernière implication est équivalente à

$$(\mathcal{F} + \mathcal{F}') \lambda (f + f').$$

D'autre part, sous les hypothèses $\mathcal{K} \pi_R t, \mathcal{F} \lambda f, \mathcal{X} \pi_X x$

$$(\mathcal{K} \pi_R t, \mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F f(x)) \implies \mathcal{K} \cdot \mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F t \cdot f(x)$$

$$\text{d'où : } \mathcal{X} \pi_X x \implies \mathcal{K} \cdot \mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F t \cdot f(x), \text{ donc}$$

$\mathcal{K} \cdot \mathcal{F} \lambda t \cdot f$, ce qui établit le théorème.

Notation : Etant donné une famille $\{X_i\}_{i \in I}$ de filtre sur un ensemble X , nous noterons $\sup_{i \in I} X_i$ le filtre consistant de tous les ensembles de la forme $\cup_{i \in I} X_i$ où $X_i \in X_i$. En particulier

$$X_1 \cup X_2 = \sup_{i \in I} (X_1, X_2).$$

$$X_i < \sup_{i \in I} X_i$$

A tout espace vectoriel quasi-topologique (E, π_E) , nous pouvons associer une topologie (localement convexe, mais ceci ne servira pas) de la façon suivante : à tout filtre X , associons le filtre $\hat{X}$ engendrée par les ensembles convexes de X .

$$X < \hat{X}$$

Introduisons ensuite le filtre sur E défini par :

$$V_X = \sup_{X \text{ t. q. } X \pi_E x} X$$

et posons $V_x = \hat{U}_x$.

Théorème 2.4. : V_x est le filtre des voisinages de x pour une unique topologie compatible avec la structure d'espace vectoriel E , localement convexe et pour laquelle tout filtre quasi-convergent converge.

La première partie du résultat a été établie par Frölicher dans "calculus in vector spaces without norm" ([13] p.24) et pour la topologie que l'on construit ainsi, tout filtre X tel que $X \pi_E x$ est plus fin que le filtre V_x donc converge.

Remarque 2.4. : Dans la définition 1.2. Chap II (p. 26 [4]) d'une quasi-topologie localement convexe sur un espace vectoriel E , A. Bastiani impose l'existence d'une topologie sur E localement convexe séparée pour laquelle tout filtre quasi-convergent converge. Le théorème 2.4. montre en partie que cette hypothèse est satisfaite.

Etant donné un espace vectoriel quasi-topologique (E, π_E) , il existe donc une topologie compatible avec la structure vectorielle de E et pour laquelle tout filtre quasi-convergent converge. La borne supérieure de telles topologies est encore compatible avec la structure vectorielle de E ([7] - chap. I - §1 - corollaire 4). Elle sera dite sous jacente à la quasi-topologie π_E et nous la noterons $\tau(\pi_E)$. Si $\tau(\pi_E)$ est séparée, il en est de même de (E, π_E) .

En particulier la topologie $\tau(\lambda)$ sous jacente à la quasi-topologie de la convergence locale dont est muni $\mathcal{X}_{om}_\tau(X, F)$ sera appelée topologie de la convergence locale.

Si π_X et π_F sont des relations de convergence définies par des topologies, la topologie de la convergence locale coïncide avec la topologie de la convergence uniforme sur les voisinages de X ([10] - p. 94) et entre les différentes topologies, nous avons les relations suivantes :

Topologie de la convergence uniforme $\leftarrow$ Topologie de la convergence locale $\leftarrow$ Topologie de la convergence compacte

la topologie de la convergence locale et celle de la convergence compacte coïncidant si X est localement compact.

Si E et F sont deux espaces vectoriels quasi-topologiques, toute application quasi-continue de E dans F est continue pour les topologies $\tau(\pi_E)$ et $\tau(\pi_F)$ d'où l'existence d'un foncteur τ de la catégorie des espaces vectoriels quasi-topologiques dans la catégorie des espaces vectoriels topologiques. Ce foncteur ne commute pas avec les produits puisqu'en général :

$$\tau(\pi_{E \times F}) \subsetneq \tau(\pi_E) \times \tau(\pi_F) \quad (\text{Cf } [7] - \text{p.30 ex. 14})$$

En outre, si (E, π_E) est un espace vectoriel quasi-topologique, F un espace topologique, l'ensemble des applications quasi-continues de E dans F est identique à l'ensemble des applications continues de E dans F où E est muni de la topologie $\tau(\pi_E)$.

Appelons donc $\tilde{E}$ la catégorie des espaces vectoriels quasi-topologiques. $\mathcal{E}$ est une sous catégorie pleine de $\tilde{E}$. Soit

$$\sigma : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \tilde{E} \\ F & \rightsquigarrow & \sigma_F \end{array} \quad \text{le plongement de } E \text{ dans } \tilde{E}$$

Les deux foncteurs τ et σ sont adjoints (σ adjoint à droite de τ). En effet, d'après la remarque précédente, $\text{Hom}_{\tilde{E}}(E, \sigma_F)$ est isomorphe à $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(\tau_E, F)$.

La définition 2.2. se généralise au cas où l'espace d'arrivée est seulement un espace quasi-topologique.

Définition 2.5. : Soient (X, π_X) et (Y, π_Y) deux espaces quasi-topologiques. On appellera quasi-topologie de la convergence locale sur $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y)$ la quasi-topologie λ définie par :

" $\mathcal{F} \lambda f$ si et seulement si $\mathcal{X} \pi_X x$ entraîne $\mathcal{F}(x) \pi_Y f(x)$ "
où $\mathcal{F}$ est un filtre sur $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y)$ et $\mathcal{F}(x)$ le filtre sur Y admettant pour base les ensembles $\cup_{f \in \mathcal{F}} f(\xi)$ où $\emptyset \in \mathcal{F}$ et $\xi \in \mathcal{X}$.

Muni de cette quasi-topologie, $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y)$ sera noté $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{F}}(X, Y)$. (Notation qui sera justifiée par le théorème 2.8.)

Proposition 2.6. : La quasi-topologie λ sur $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y)$ rend quasi-continue l'application d'évaluation

$$\underline{\text{Ev}} : (x, f) \longrightarrow f(x)$$

de $X \times \text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y)$ dans Y (par abus de langage, on note Ev l'application précédente au lieu de u (cf. chapitre I)).

En effet, d'après la définition de λ :

$$(\mathcal{X} \pi_X x, \mathcal{F} \lambda f) \implies \mathcal{F}(x) \pi_Y f(x)$$

ce qui, en vertu de la définition de la quasi-topologie produit sur $X \times \text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y)$ assure la quasi-continuité de Ev.

Théorème 2.7. : $(X, \pi_X), (Y, \pi_Y), (Z, \pi_Z)$ désignant trois objets de $\tilde{\mathcal{T}}_f \text{Hom}(Z, \mathcal{H}om_f(X, Y))$ est isomorphe à $\text{Hom}_f(Z \times X, Y)$ dans $\mathcal{E}ns$

Soit h une application quasi-continue : $Z \rightarrow \mathcal{H}om_f(X, Y)$, $h \in \text{Hom}_f(Z, \mathcal{H}om_f(X, Y))$. Il lui correspond une application $\bar{h} : Z \times X \rightarrow Y$ définie par $\bar{h} = EV(h \times 1)$. Comme l'application EV est quasi-continue en vertu de 2.6, il en est de même de $\bar{h}$.

Réciproquement, soit $\bar{h}$ un élément de $\text{Hom}_f(Z \times X, Y)$

$$\bar{h} : Z \times X \longrightarrow Y.$$

Soient $Z \xrightarrow{\pi_Z} z$ et $X \xrightarrow{\pi_X} x$; définissons $h : Z \rightarrow \bar{h}_z$ par $h(z)(x) = \bar{h}(z, x)$ où $\bar{h}_z$ est l'application quasi-continue : $x \rightarrow \bar{h}(z, x)$

$$\bar{h}(Z, X) = h(Z)(X) \quad \pi_Y \bar{h}(z, x) = \bar{h}_z(x).$$

Or, d'après la définition même de la quasi-topologie de la convergence locale :

$$(X \xrightarrow{\pi_X} x, h(Z)(X) \xrightarrow{\pi_Y} \bar{h}_z(x)) \implies h(Z) \lambda \bar{h}_z$$

Finalement $Z \xrightarrow{\pi_Z} z \implies h(Z) \lambda \bar{h}_z$ ce qui assure l'appartenance de h à $\text{Hom}_f(Z, \mathcal{H}om_f(X, Y))$

De la proposition 2.6. et du théorème 2.7, il résulte :

Théorème 2.8. : La quasi-topologie de la convergence locale est une structure canonique sur $\text{Hom}_f(X, Y)$ et la catégorie d'ensembles structurés $(\tilde{\mathcal{T}}, V)$ est fermée (V désigne le foncteur oubli de $\tilde{\mathcal{T}}$ dans $\mathcal{E}ns$).

En vertu de la propriété 5.1. du chapitre I, l'isomorphisme du théorème 2.7. est aussi un isomorphisme dans la catégorie $\tilde{\mathcal{T}}$.

Remarque 2.9. : Si X, Y, Z sont des espaces topologiques, X localement compact, on retrouve les résultats de 3. Chapitre I, la quasi-topologie de la convergence locale coïncidant alors avec la topologie de la convergence compacte.

3 - Soient E et F deux objets de $\tilde{E}$.

Théorème 3.1. : La quasi-topologie de la convergence locale sur $\text{Hom}_{\tilde{E}}(E, F)$ est une structure canonique et la catégorie d'ensembles structurés $(\tilde{E}, V)$ est fermée.

En outre $\tilde{E}$ admet des limites projectives.

Soient E et F deux objets de $\tilde{E}$ et $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires quasi-continues (c'est à dire compatibles avec les structures vectorielles quasi-topologiques de E et F, suivant la terminologie employée dans l'introduction).

$$\mathcal{L}(E, F) \subset \text{Hom}_{\tilde{E}}(E, F)$$

Munissons $\mathcal{L}(E, F)$ de la quasi-topologie de la convergence locale induite et notons $\mathcal{L}_{\lambda}(E, F)$ l'espace vectoriel quasi-topologique ainsi obtenu.

Proposition 3.2. : Les applications

- a) $\text{EV} : \mathcal{L}_{\lambda}(E, F) \times E \longrightarrow F$
 b) $\text{I}_{E, F, G} : \mathcal{L}_{\lambda}(E, F) \times \mathcal{L}_{\lambda}(F, G) \longrightarrow \mathcal{L}_{\lambda}(E, G)$

où E, F, G sont trois objets de $\tilde{E}$, définies respectivement par

$$(f, x) \rightsquigarrow f(x)$$

$$(f, g) \rightsquigarrow g \circ f$$

sont quasi-continues.

a) résulte du théorème 3.1. ; quant à b), il suffit de l'établir comme la proposition 5.2. du chapitre I. L'application

$\bar{\Phi}_{E, F, G} : \mathcal{L}_\lambda(E, F) \times \mathcal{L}_\lambda(F, G) \times E \longrightarrow G$ se factorise comme suit :

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{L}_\lambda(E, F) \times E \times \mathcal{L}_\lambda(F, G) & \xrightarrow{\bar{\Phi}_{E, F, G}} & G \\
 \downarrow \text{EV} \times \text{id}_{\mathcal{L}_\lambda(F, G)} & \nearrow \text{EV} & \\
 \mathcal{L}_\lambda(F, G) \times F & &
 \end{array}$$

Elle est donc quasi-continue. D'après le théorème 3.1., il lui correspond une application quasi-continue de $\mathcal{L}_\lambda(E, F) \times \mathcal{L}_\lambda(F, G)$ dans $\mathcal{L}_\lambda(E, G)$ qui est précisément l'application $\bar{\Phi}_{E, F, G}$.

Remarque 3.3. : Le foncteur $R^G : \tilde{E} \longrightarrow \tilde{E}$ défini en 5. chapitre I, admet un adjoint à gauche S^G , commute aux limites gauches et est exact à gauche. D'où :

- $\underline{\text{Hom}}_E(G, E \times F) = \underline{\text{Hom}}_E(G, E) \times \underline{\text{Hom}}_E(G, F)$ (proposition 5.3. Chap. I).

- Si la suite

$0 \longrightarrow E \longrightarrow F$ est exacte, il en est de même de la suite

$$0 \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_E(G, E) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_E(G, F)$$

où $\underline{\text{Hom}}_E(G, \cdot)$ désigne l'espace $\text{Hom}_E(G, \cdot)$ muni de la quasi-topologie de la convergence locale (proposition 5.3. - Chapitre I).

4 - Nous avons vu que la quasi-topologie de la convergence locale sur $\text{Hom}(E, F)$ généralisait la topologie de la convergence uniforme sur les voisinages de E dans le cas où E et F étaient des espaces vectoriels topologiques. Frölicher exhibe comme suit un ensemble et un type de quasi-topologie sur cet ensemble qui dans le cas espaces vectoriels quasi-topologiques généralise la topologie de la convergence uniforme sur les parties bornées dans le cas des espaces vectoriels topologiques normés ([13]).

Définition 4-1 : Sur un espace vectoriel quasi-topologique E , les filtres $\mathcal{X}$ tels que $\mathcal{X} \cdot \mathcal{X} \pi_E 0_E$ où $\mathcal{X}$ désigne le filtre des voisinages de l'origine dans $\mathbb{R}$ et 0_E l'origine dans E , sont appelés filtres quasi-bornés. Une fonction f de E dans F où F est un autre espace vectoriel quasi-topologique, est appelée quasi-bornée si elle transforme un filtre quasi-borné en un filtre quasi-borné c'est à dire si

$$\mathcal{X} \cdot \mathcal{X} \pi_E 0_E \longrightarrow \mathcal{X} \cdot f(\mathcal{X}) \pi_F 0_F \text{ (voir [4])}.$$

Munissons l'ensemble $\mathcal{B}(E, F)$ des fonctions quasi-bornées de E dans F de la quasi-topologie β définie par :

$$\mathcal{F} \beta_{\mathcal{B}(E, F)} \text{ si et seulement si : } \mathcal{X} \cdot \mathcal{X} \pi_E 0_E \Rightarrow \mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F 0_F.$$

On établit facilement que $\mathcal{B}(E, F)$ muni de la quasi-topologie est un espace vectoriel quasi-topologique.

Proposition 4.2 : Si E est un espace vectoriel normé et F un espace uniforme, la quasi-topologie β sur $\mathcal{B}(E, F)$ coïncide avec la topologie de la convergence uniforme sur les ensembles bornés.

$\mathcal{B}(E, F)$ peut être muni de la topologie de la convergence uniforme sur les parties bornées ; soit θ cette topologie. $\mathcal{F} \theta f$ dans $\mathcal{B}(E, F)$ si et seulement si pour chaque partie bornée X de E contenant x , $\mathcal{F}(X) \pi_F f(x)$. Utilisant alors le résultat suivant dû à Frölicher ([13] p.15) :

"Sur un espace vectoriel normé, un filtre est quasi-borné si et seulement si il contient une partie bornée", on voit immédiatement que :

$$\mathcal{F} \text{ o } f \longleftrightarrow \mathcal{F} \beta f$$

Toute application linéaire quasi-continue de E dans F est quasi-bornée, d'où la proposition suivante :

Proposition 4.3. : Si E et F sont des espaces vectoriels normés, la quasi-topologie β induite sur $\mathcal{L}(E, F)$ (ensemble des applications continues et linéaires de E dans F) coïncide avec la topologie définie à partir de la norme sur $\mathcal{L}(E, F)$

On sait, en effet, que la topologie définie à partir de la norme sur $\mathcal{L}(E, F)$ coïncide avec la topologie de la convergence uniforme sur les parties bornées.

Notons $\mathcal{L}_\beta(E, F)$ l'espace $\mathcal{L}(E, F)$ muni de cette dernière topologie.

La topologie de $\mathcal{L}_\beta(E, F)$ coïncide avec la topologie de la convergence uniforme sur les parties fermées bornées ([6] § 1 - n°6 - prop. 1) qui coïncide elle-même si E est de dimension finie avec la topologie de la convergence compacte (il y a identité entre les parties fermées bornées et les parties compactes), c'est à dire encore avec la topologie de la convergence locale puisque E est alors localement compact.

Proposition 4.4. : Si E et F sont des espaces vectoriels normés, E étant en plus de dimension finie, la quasi topologie β sur $\mathcal{L}(E, F)$ coïncide avec la topologie de la convergence locale.

II - Différentiabilité dans la catégorie $\tilde{E}$ des espaces vectoriels quasi-topologiques

1 - Définition 1.1 : (A. BASTIANI [4]) : Soient E et F deux espaces vectoriels quasi-topologiques et f une application de E dans F. On dira que f est différentiable sur une partie X de E muni de la quasi-topologie induite si pour tout $x \in X$, il existe une application linéaire quasi-continue Df(x) de E dans F appelée différentielle de f sur X en x rendant quasi-continue l'application Δf définie comme suit :

Soient $\tilde{X}$ l'ensemble des triplets (x, t, v) où $x \in X$, $t \in \mathbb{R}$, $v \in X$, $x + tv \in X$; alors Δf est l'application de $\tilde{X}$ dans F qui vaut :

$$\begin{cases} \Delta f(x, t, v) = \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} - \langle Df(x), v \rangle & \text{si } t \neq 0 \\ \Delta f(x, 0, v) = 0 & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

Propriétés des applications différentiables : les démonstrations de a), b), c), e) sont identiques à celles données par BASTIANI dans [4] p.39 - 40.

- a) Si f est différentiable sur X, alors f est quasi-continue sur X.

- b) Si f est différentiable sur X, l'application

$Df : x \longrightarrow Df(x)$ de X dans $\mathcal{L}_\lambda(E, F)$ est quasi-continue. En effet, selon [4], la définition 1.1. entraîne la quasi continuité de l'application

$$(x, v) \longrightarrow \langle Df(x), v \rangle , \text{ c'est à dire la}$$

quasi-continuité de Df en vertu du théorème 2.8 §I (Cette remarque nous permettra de remplacer l'expression "application différentiable" par l'expression "application de classe D^1 ").

Supposons que E soit métrisable et tonnelé (par exemple un espace de Fréchet) et soit F un objet de $\mathcal{E}$. Si f est une application de X dans F dérivable sur X, c'est à dire admettant une dérivée en tout point de X dans toute direction, désignons par D.f l'application $(x, v) \longrightarrow \langle Df(x), v \rangle$ de $X \times E$ dans F. Si les applications

$$\begin{aligned} D.f_v : x &\longrightarrow \langle Df(x), v \rangle \text{ de } X \text{ dans } F \\ D.f_x : v &\longrightarrow \langle Df(x), v \rangle \text{ de } E \text{ dans } F \end{aligned}$$

sont continues, autrement dit si D.f est séparément continue, D.f est continue (= quasi continue) (Voir [8] §4 théor.3 p.28). Donc l'application $Df : X \longrightarrow \mathcal{L}_\lambda(E, F)$ est quasi continue (théor.2.8. § I) et est différentiable.

c) La composée de deux applications différentiables est différentiable. La démonstration est exactement celle de [4]. Faisons toutefois la remarque suivante. Soient E, F, G trois objets de $\widetilde{\mathcal{E}}$; si f est une application différentiable d'un sous-espace X de E dans F et g une application différentiable de F dans G, $Dg(f(x)) \circ Df(x)$ est la différentielle de $g \circ f$ en un point x de X. D'autre part, l'application

$$x \xrightarrow{\sim} Dg \circ f(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x)$$

de X dans $\mathcal{L}_\lambda(E, G)$ se factorise comme suit

$$\begin{array}{ccc} X \longrightarrow \mathcal{L}_\lambda(E, F) \times \mathcal{L}_\lambda(F, G) & \xrightarrow{\Phi_{E, F, G}} & \mathcal{L}_\lambda(E, G) \\ x \xrightarrow{\sim} (Df(x), Dg(f(x))) & \xrightarrow{\sim} & Dg(f(x)) \circ Df(x). \end{array}$$

La quasi-continuité de l'application $\Phi_{E, F, G}$ (proposition 3.2. § I) assure alors la quasi-continuité de l'application

$$\begin{aligned} X &\longrightarrow \mathcal{L}_\lambda(E, G) \\ x &\xrightarrow{\sim} Dg(f(x)) \circ Df(x) \end{aligned}$$

ce qui est une condition nécessaire de validité du théorème de transitivité ponctuelle.

c') toute application linéaire quasi-continue est différentiable.

d) Si F est séparé, la différentielle est unique.

Supposons, en effet, qu'il existe deux applications linéaires $D_1 f(x)$ et $D_2 f(x)$ satisfaisant aux conditions de la définition 1.1. Soient $\Delta_1 f$ et $\Delta_2 f$ les applications définies par :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta_1 f(x, t, v) = \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} - \langle D_1 f(x), v \rangle \\ \Delta_1 f(x, 0, v) = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta_2 f(x, t, v) = \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} - \langle D_2 f(x), v \rangle \\ \Delta_2 f(x, 0, v) = 0 \end{array} \right.$$

Considérons l'application

$$(\Delta_2 f - \Delta_1 f)(x, t, v) = \langle D_1 f(x), v \rangle - \langle D_2 f(x), v \rangle.$$

Nous avons l'égalité suivante entre filtres :

$$[(\Delta_2 f - \Delta_1 f)(x, t, v)] = (\Delta_2 f - \Delta_1 f)([x], [t], [v]).$$

En particulier pour $t = 0$,

$$[(\Delta_2 f - \Delta_1 f)(x, 0, v)] = (\Delta_2 f - \Delta_1 f)([x], [0], [v]) \in \mathcal{U}_F^0$$

$$\text{d'où : } (\Delta_2 f - \Delta_1 f)(x, 0, v) = 0$$

$$\text{et } \langle D_1 f(x), v \rangle = \langle D_2 f(x), v \rangle, \forall v$$

Nous supposons dans la suite du chapitre la quasi-topologie de F séparée.

e) le produit de deux applications différentiables est différentiable.

f) La nouvelle notion de différentiabilité est plus forte que celle de Frölicher dans [13] qui n'entraîne pas nécessairement la quasi-continuité de l'application

$$Df : x \rightarrow Df(x) \text{ de } X \text{ dans } \mathcal{L}_\lambda(E, F)$$

(la structure mise par Frölicher sur $\mathcal{L}(E, F)$ est différente de la quasi-topologie de la convergence locale).

Si le sous-espace X est réduit à un point x , la notion de différentiabilité de Frölicher au point x va coïncider avec celle de A. BASTIANI si l'on remplace la quasi-topologie π_E par la quasi-topologie π'_E définie comme suit : " π'_E si et seulement si π_E et si π'_E est quasi bornée".

g) Si E_1 et E_2 sont deux espaces vectoriels quasi-topologiques et $f : (x, y) \rightarrow f(x, y)$ une application différentiable de $E_1 \times E_2$ dans F , les applications

$$f_2 : x \xrightarrow{i_1} (x, y_0) \xrightarrow{f} f(x, y_0) \text{ de } E_1 \text{ dans } F$$

$$f_2 : y \xrightarrow{i_2} (x_0, y) \xrightarrow{f} f(x_0, y) \text{ de } E_2 \text{ dans } F$$

associées respectivement à un point $y_0 \in E_2, x_0 \in E_1$ sont différentiables.

$$\text{Posons } D_1 f(x, y) = D f_1(x)$$

$$D_2 f(x, y) = D f_2(y)$$

$$D_1 f(x, y) = Df(x, y) \circ i_1$$

$$D_2 f(x, y) = Df(x, y) \circ i_2$$

$$\text{Or } (v_1, v_2) = i_1(v_1) + i_2(v_2), \text{ d'où :}$$

$$Df(x, y)(v_1, v_2) = D_1 f(x, y)v_1 + D_2 f(x, y)v_2$$

2 - Généralisation de la différentiabilité à l'ordre n.

Définition 2.1. : On dira que f est r fois différentiable sur X , sa $r^{\text{ième}}$ différentielle sur X étant $D^{(r)} f \in \mathcal{L}_\lambda^r(E, F)$ si f est $(r-1)$ fois différentiable sur X et si $D^{(r-1)} f$ est une application différentiable de X dans $\mathcal{L}_\lambda^{r-1}(E, F)$ de différentielle $D(D^{(r-1)} f) =$

$D^{(r)} f$ où $\mathcal{L}_\lambda^i(E, F)$ est définie par récurrence par l'égalité

$$\mathcal{L}_\lambda^i(E, F) = \mathcal{L}_\lambda(E, \mathcal{L}_\lambda^{i-1}(E, F)). f \text{ est une fois différentiable si}$$

f est différentiable au sens de 1.1.

f sera dite de classe D^r si f est r fois différentiable dans le cas $r \neq 0$ ou si f est quasi continue dans le cas $r = 0$.

Remarques 2.1. :

1° Si f est de classe D^r , l'application

$$D^{(r)} f : X \longrightarrow \mathcal{L}_\lambda^{(r)}(E, F) \text{ est quasi continue.}$$

2° Si E et F sont des espaces de Banach, une application de classe C^r est de classe D^r . Il y a, en effet, identité entre les applications de classe D^1 et les applications dérivables telles que l'application $X \longrightarrow \mathcal{L}_c(E, F)$ est quasi continue, l'indice c signifiant que l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F est muni de la topologie de la convergence compacte (ce résultat s'établit strictement comme le corollaire 1. p. 46 de [4]). Or une application de classe C^1 est dérivable et l'application $X \longrightarrow \mathcal{L}_b(E, F)$ est continue, où $\mathcal{L}_b(E, F)$ est muni de la topologie définie à partir de la norme, plus fine que la topologie de la convergence compacte, ce qui assure la continuité de l'application

$$X \longrightarrow \mathcal{L}_b(E, F) \longrightarrow \mathcal{L}_c(E, F)$$

On voit ainsi de proche en proche que toute application de classe C^r est de classe D^r , mais non réciproquement.

Toutefois, si E est un espace de Banach réflexif (par exemple si E est de dimension finie), il y a identité entre les applications de classe D^r et les applications de classe C^r puisqu'alors

la quasi-continuité de l'application

$$D^{(r)} f : X \longrightarrow \mathcal{L}_\lambda^{(r)}(E, F)$$

entraîne la continuité de l'application $X \longrightarrow \mathcal{L}_b^{(r)}(E, F)$ (voir [4] p. 48 corollaire 5 et la proposition 4.4. du § I).

Proposition 2.2. : Pour tout entier $i \leq r$, si f est r fois différentiable sur X , l'application

$$D^i f : (x, v_1, \dots, v_i) \longrightarrow \langle D^{(i)} f(x), (v_1, \dots, v_i) \rangle$$

est une application quasi-continue de $X \times E^i$ dans F .

En effet les applications $X \longrightarrow \mathcal{L}_\lambda^i(E, F)$ sont quasi-continues, d'où, par application du théorème 2.8 § I, la proposition:

Proposition 2.3. : La composée de deux applications r fois différentiables est une application r fois différentiable.

Définition 2.4. : Une application de classe D^r , $\forall r$, est dite de classe D^∞ .

Appelons maintenant Δ^r (resp. Δ^∞) la catégorie des sous espaces d'espaces vectoriels quasi-topologiques munis des quasi-topologies induites, ouverts pour les topologies sous jacentes et dont les morphismes sont les applications de classe D^r (resp. de classe D^∞).

Pour X objet de Δ^r (resp. Δ^∞) et F espace vectoriel quasi-topologique, munissons $\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\Delta^\infty}(X, F)$) de la quasi-topologie δ_r (resp. δ_∞) définie comme suit :

Définition 2.5. : la quasi-topologie δ_r , $r < \infty$, est la quasi-topologie la moins fine rendant quasi-continues les applications

$$D^i : f \longrightarrow D^i f$$

de $\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$ dans $\mathcal{L}_\lambda^i(X \times E^i, F)$ où $D^i f$ désigne l'application introduite dans la proposition 2.2. i variant entre 0 et r inclus.

Proposition 2.6. : L'injection $\text{Hom}_{\Delta^{r'}}(X, F) \longrightarrow \text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$, $r' \geq r$, est quasi-continue quand on munit les espaces respectivement des quasi topologies $\delta_{r'}$ et δ_r .

Proposition 2.7 : La quasi-topologie δ_r est compatible avec la structure vectorielle de $\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$.

C'est une quasi-topologie initiale : $\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$ muni de la quasi-topologie δ_r est la limite projective du système constitué par $\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$ et la seule flèche

$$\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F) \rightarrow \prod_{i=1}^r \mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^i}}(X \times E^i, F).$$

Or nous savons que $\tilde{E}$ admet des limites projectives.

Définition 2.8 : On appellera quasi-topologie δ_∞ sur $\text{Hom}_{\Delta^\infty}(X, F)$ la quasi-topologie la moins fine rendant quasi continues toutes les injections $\text{Hom}_{\Delta^\infty}(X, F) \longrightarrow \text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$ où $\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$ est muni de la quasi-topologie δ_r (quasi-topologie initiale).

Proposition 2.9 : La quasi-topologie δ_∞ est compatible avec la structure vectorielle de $\text{Hom}_{\Delta^\infty}(X, F)$.

Nous noterons $\mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^r}}(X, F)$ (resp. $\mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^\infty}}(X, F)$) l'ensemble $\text{Hom}_{\Delta^r}(X, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\Delta^\infty}(X, F)$) muni de la quasi-topologie δ_r (resp. δ_∞). $\mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^\infty}}(X, F)$ apparait alors comme la limite projective du système constitué par les $\mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^r}}(X, F)$ et les injections :

$$\mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^{r'}}}(X, F) \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^r}}(X, F), \quad r' \geq r.$$

Soit maintenant $\tilde{E}^r$ (resp. $\tilde{E}^\infty$) la catégorie des espaces vectoriels quasi topologiques dont les morphismes sont les applications de classe D^r (resp. D^∞). Nous avons le théorème suivant et son corollaire :

Théorème 2.10 : L'application d'évaluation

$$EV : (f, x) \rightsquigarrow f(x)$$

de $\mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^r}}(X, F) \times X$ (resp. $\mathcal{H}_{\text{om}_{\Delta^\infty}}(X, F) \times X$) dans F est de classe D^r (resp. de classe D^∞).

Désignons par E l'espace vectoriel quasi topologique dont X est un ouvert pour la topologie $\tau(\pi_E)$. Considérons l'application ΔEV de $\mathcal{H}_{\Delta r}(X, F) \times X \times \mathbb{R} \times \mathcal{H}_{\Delta r}(X, F) \times X$ dans F définie par :

$$\begin{cases} \Delta EV(f, x, t, \varphi, v) = \frac{(f+t\varphi)(x+tv) - f(x)}{t} - \langle Df(x), v \rangle - E v_0, & \text{si } t \neq 0. \\ \Delta EV(f, x, 0, \varphi, v) = 0. \end{cases}$$

L'application $(\varphi, v) \longrightarrow \langle Df(x), v \rangle + Ev_0(\varphi, x)$
 $\langle Df(x), v \rangle + \varphi(x)$

de $\mathcal{H}_{\Delta r}(X, F) \times E$ dans F est linéaire puisque $Df(x)$ l'est et quasi-continue car $\mathcal{N}\delta_r \varphi, v \pi_x v$ entraînent :

$$\langle Df(x), v \rangle + \mathcal{N}(x) \pi_F \langle Df(x), v \rangle + \varphi(x)$$

puisque $Df(x)$ est quasi continue.

Si, en outre, $\mathcal{F}\delta_r f, \mathcal{K} \pi_{\mathbb{R}} t$, alors

$$\begin{cases} \mathcal{F}(x) \pi_F f(x) \\ D\mathcal{F}(x) \pi_{\mathcal{L}_\lambda}(E, F) Df(x) \\ \mathcal{N}(\mathcal{K} + \mathcal{K}v) \pi_F \varphi(x+tv), \text{ relations qui entraînent} \end{cases}$$

l'autre relation : $\Delta Ev(\mathcal{F}, \mathcal{K}, \mathcal{N}, \mathcal{V}) \pi_F \Delta Ev(f, x, t, \varphi, v)$.

Cette dernière assure la différentiabilité de l'application EV . De proche en proche, on établirait ainsi que Ev est de classe D^r .

Le théorème 2.10 est ainsi établi.

Corollaire 2.11. : Sur $\text{Hom}_{\mathbb{R}}(E, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\mathbb{R}}^{\omega}(E, F)$), la quasi topologie δ_r (resp. δ_{ω}) est une structure privilégiée. Le couple $(\tilde{E}^r, V)$ (resp. $\tilde{E}^{\omega}, V$) constitue une catégorie d'ensemble structurés semi-fermée.

Plus précisément si Z, X sont des objets de Δ^∞ (Z sous espace de G , X sous espace de E) et F un espace vectoriel quasi topologique, nous allons démontrer que l'application (notée λ^{EV} par abus de langage au lieu de λ^u suivant les notations employées dans le chapitre I)

$$\lambda^{EV} : \text{Hom}_{\Delta^\infty}(Z, \underline{\mathcal{H}}\text{om}_{\Delta^\infty}(X, F)) \longrightarrow \text{Hom}_{\Delta^\infty}(Z \times X, F)$$

est une bijection.

Compte tenu du corollaire 2.11, il suffit de montrer qu'à une application $\bar{h} : Z \times X \longrightarrow F$ de classe D^∞ , il correspond une application $h : Z \longrightarrow \underline{\mathcal{H}}\text{om}_{\Delta^\infty}(X, F)$ de classe D^∞ définie par $h(z) = \bar{h}_z(\cdot) = \bar{h}(z, \cdot)$ (confer le théorème 2.7. du § I)

Procédons par récurrence. Posons.

$$\begin{aligned} D_h \circ i_1(z) &= D_z \bar{h}(z, x) \\ D_h \circ i_2(x) &= D_x \bar{h}(z, x) \end{aligned}$$

où i_1 et i_2 ont été définies en g) - 1 - § II. Supposons l'application h de classe D^r et démontrons qu'elle est de classe D^{r+1} .

Il existe alors, par hypothèse, pour tout z , une application

$$\left(D_z^{(r)} \bar{h}_z \right) (\cdot) \quad \text{définie sur } G^r \text{ à valeurs dans } \underline{\mathcal{H}}\text{om}_{\Delta^\infty}(X, F) \\ (v_1, \dots, v_r)$$

multilinéaire (par rapport aux v_i) et quasi continue. L'application

$$\begin{aligned} (v_1, \dots, v_r, v) &\longrightarrow \langle D_z \left[(D_z^r \bar{h}_z)(v_1, \dots, v_r) \right], v \rangle \\ &\parallel \\ &(D_z^{(r+1)} \bar{h}_z)(v_1, \dots, v_r, v) \end{aligned}$$

de $G^r \times G$ dans $\underline{\mathcal{H}}\text{om}_{\Delta^\infty}(X, F)$ est aussi, pour tout z , multilinéaire par rapport aux v . Elle est, en outre, quasi-continue car si v_j désignent des filtres quasi-convergeants vers v_j ($1 \leq j \leq r$) et v un filtre quasi convergent vers v dans G , on a la relation :

$$(D_z^{(r+1)} \bar{h}_z)(v_1, v_2, \dots, v_r, v) \int_{\infty} (D_z^{(r+1)} \bar{h}_z)(v_1, \dots, v_r, v),$$

Etablir cette dernière relation revient, en effet, à montrer que, $\forall$ l'entier i , pour un filtre $\mathcal{X}$ tel que $\mathcal{X} \pi_E x$,

$$D_x^i \left[(D_z^{(r+1)} \bar{h}_z)(v_1, \dots, v_r, v) \right] \pi_{\mathcal{X}}^i \left[(D_z^{(r+1)} \bar{h}_z)(v_1, \dots, v_r, v) \right]$$

Or, c'est une conséquence du fait que l'application $\bar{h}$ est de classe D^∞ .

Reste alors à démontrer la quasi-continuité de l'application définie par :

$$\left\{ \begin{aligned} & \Delta(D_z^{(r)} \bar{h}(z, t, v))(v_1, \dots, v_r) \cdot (.) \\ &= \frac{(D_z^{(r)} \bar{h}_{z+tv})(v_1, \dots, v_r) \cdot (.) - (D_z^{(r)} \bar{h}_z)(v_1, \dots, v_r) \cdot (.)}{t} \\ & - < D_z \left[(D_z^{(r)} \bar{h}_z)(v_1, \dots, v_r) \cdot (.) \right], v >, \text{ si } t \neq 0 \\ & \Delta(D_z^{(r)} \bar{h}(z, 0, v))(v_1, \dots, v_r) \cdot (.) = 0, \end{aligned} \right.$$

c'est à dire que, $\mathcal{Z}, \mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{X}$ désignant des filtres quasi convergents vers z, t, v, x ,

$$\Delta(D_z^{(r)} \bar{h}(\mathcal{Z}, \mathcal{K}, \mathcal{M}))(v_1, \dots, v_r) \cdot (.) \int_{\infty} \Delta(D_z^{(r)} \bar{h}(z, t, v))(v_1, \dots, v_r) \cdot (.)$$

ce qui est équivalent à démontrer la relation suivante, $\forall$ l'entier i ,

$$D_x^{(i)} \left[\Delta(D_z^{(r)} \bar{h}(Z, \mathcal{K}, \mathcal{A})) (v_1, \dots, v_r) (\mathcal{X}) \right] \pi_{\alpha_\lambda}^{(i)}(E^i, F) \left[\Delta(D_z^{(r)} \bar{h}(z, t, v)) (v_1, \dots, v_r) (x) \right]$$

ou encore

$$\left\{ \frac{D_x^{(i)} \left[D_z^{(r)} \bar{h}(Z + \mathcal{K}, \mathcal{A}, \mathcal{X}) (v_1, \dots, v_r) \right] - D_x^{(i)} \left[D_z^{(r)} \bar{h}(Z, \mathcal{X}) (v_1, \dots, v_r) \right]}{\mathcal{K}} \right. \\ \left. - D_x^{(i)} \left\langle D_z^{(r+1)} \bar{h}(Z, \mathcal{X}) (v_1, \dots, v_r, v) \right\rangle \pi_{\alpha_\lambda}^{(i)}(E^i, F) \left\{ \frac{D_x^{(i)} D_z^{(r)} \bar{h}(z+tv, x) (v_1 \dots \dots v_r) - D_x^{(i)} D_z^{(r)} \bar{h}(z, x) (v_1, \dots, v_r)}{t} - D_x^{(i)} \left\langle D_z^{(r+1)} \bar{h}(z, x) \right\rangle (v_1, \dots, v_r, v) \right\} \right\}.$$

Mais cette dernière relation résulte de la différentiabilité de classe D^∞ de l'application h . On a ainsi, puisque, pour $r = 1$, le raisonnement que l'on vient de tenir est vrai, le théorème

Théorème 2.12. : Sur $\text{Hom}_{\Delta}(\mathcal{X}, F)$, la quasi topologie δ_∞ est une structure canonique.

Théorème 2.13. : Sur $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{E}, F)$ la quasi topologie δ_∞ est une structure canonique. $(\tilde{E}^\infty, V)$ est une catégorie d'ensembles structurées fermée.

Corollaire 2.14. : L'application

$$\begin{aligned} \underline{\mathcal{H}}om_{\tilde{E}^\infty}(F, G) \times \underline{\mathcal{H}}om_{\tilde{E}^\infty}(E, F) &\longrightarrow \underline{\mathcal{H}}om_{\tilde{E}^\infty}(E, G) \\ (g, f) &\rightsquigarrow g \circ f \end{aligned}$$

est de classe D^∞ . Plus généralement, l'application

$$\begin{aligned} \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, U) \times \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(U, G) &\longrightarrow \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, G) \\ (f, g) &\rightsquigarrow g \circ f \end{aligned}$$

où F et G sont des espaces vectoriels quasi topologiques et U un ouvert de F pour la topologie τ (τ_F), est de classe D^∞ .

La première partie du corollaire est conséquence de la proposition 5.2. du chapitre I, la deuxième du théorème 2.12 comme suit : la quasi topologie δ_∞ est une structure canonique sur $\underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, G)$; donc, pour tout objet Z de Δ^∞ , à une application de classe D^∞ de $Z \times X$ dans G, il correspond une application de classe D^∞ de Z dans $\underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, G)$.

Considérons maintenant le sous espace $\underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, U)$ de $\underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, F)$ muni de la quasi topologie induite et appliquons le résultat précédent au cas où $Z = \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, F) \times \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(U, G)$.

Puisque l'application

$$\begin{aligned} \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, F) \times \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(U, G) \times X &\longrightarrow G \\ (f, g, x) &\rightsquigarrow (g \circ f)(x) \end{aligned}$$

est de classe D^∞ , l'application

$$\begin{aligned} \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, F) \times \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(U, G) &\longrightarrow \underline{\mathcal{H}}om_{\Delta^\infty}(X, G) \\ (f, g) &\rightsquigarrow g \circ f \end{aligned}$$

est aussi de classe D^∞ (confer la démonstration de 5.2. chap. I).

L'application $\bar{\Phi}_{X, U, G}$ se factorise alors comme suit :

$$\begin{array}{ccc}
 \underline{\mathcal{H}}_{\text{om}}_{\Delta^\infty}(X, U) \times \underline{\mathcal{H}}_{\text{om}}_{\Delta^\infty}(U, G) & \xrightarrow{\bar{\Phi}_{X, U, G}} & \underline{\mathcal{H}}_{\text{om}}_{\Delta^\infty}(X, G) \\
 \downarrow & \parallel & \nearrow \\
 \underline{\mathcal{H}}_{\text{om}}_{\Delta^\infty}(X, F) \times \underline{\mathcal{H}}_{\text{om}}_{\Delta^\infty}(U, G) & &
 \end{array}$$

et est, par conséquent, de classe D^{D} .

Remarque : Le fait que les quasi-topologies λ et δ_r soient définies directement à partir des valeurs que prennent les fonctions a joué un rôle primordial dans l'établissement des catégories fermées.

Interprétation des résultats du chapitre II à l'aide de [3] et [3] bis .

- Appliquons les résultats du chapitre I ; il est possible de plonger la catégorie des espaces topologiques dans une catégorie $\tilde{\mathcal{T}}$ "minimale" telle que le foncteur Σ qui réalise le plongement de $\mathcal{T}$ dans la catégorie fermée $\tilde{\mathcal{T}}$ se factorise comme suit :

$$\begin{array}{ccc}
 & & \tilde{\mathcal{T}} \\
 & \nearrow \Sigma & \\
 \mathcal{T} & & \\
 & \searrow & \\
 & & \tilde{\mathcal{T}}^k \\
 & & \uparrow \tilde{\Sigma} \\
 & & \tilde{\mathcal{T}}
 \end{array}$$

$\tilde{\Sigma}$ identifié $\tilde{\mathcal{T}}^k$ à une sous catégorie pleine de $\tilde{\mathcal{T}}$

En exprimant simplement que $\tilde{\mathcal{T}}^k$ est une catégorie fermée, nous pouvons retrouver pour $\tilde{\mathcal{T}}^k$ un certain nombre de résultats énoncés au chapitre II. Appelons application épicontinue un morphisme de $\tilde{\mathcal{T}}^k$, espace épitopologique un objet de $\tilde{\mathcal{T}}^k$. Un espace épitopologique (resp. un morphisme épicontinue) peut-être identifié à un espace quasi-topologique (resp. un morphisme quasi-continu).

a) Ph. Antoine dans [3] et [3] bis définit un foncteur $R : \tilde{T} \rightarrow T$ adjoint au foncteur I qui à tout objet de X de $\tilde{T}$ associe un espace topologique (dit sous jacent à X).

La topologie de $R(X)$ est la moins fine pour laquelle tout filtre quasi convergent converge. On retrouve ainsi le résultat exprimé par A. BASTIANI dans [4] p. 24 qui permet d'associer à tout espace épitopologique un espace topologique ayant même ensemble sous jacent.

b) Soient X un espace épitopologique, VX l'ensemble sous jacent, $\mathcal{X}$ un filtre de E . Posons $A = \bigcap_{\xi \in \mathcal{X}} \xi$; A est éventuellement vide. Soient $a \in E$, $E' = \bigcap_A E$ et $\hat{E} = E' \cup \{a\}$ l'union disjointe de E' et du point a . $\hat{E}$ peut être muni de la topologie dont les ouverts sont

- les parties de E'
- les ensembles de la forme $\{a\} \cup (\xi \cap E')$, $\xi \in \mathcal{X}$.

Notons $E_{\mathcal{X}}$ l'espace topologique ainsi construit.

Associons à l'application identique $f : E \rightarrow E$, pour x fini $\in E$, l'application $\hat{f}_x$ définie comme suit :

$$\begin{cases} \hat{f}_x (\xi \cap E') = f \mid \xi \cap E' \\ \hat{f}_x (a) = x \end{cases}$$

Définition 3.1. : On dira que le filtre $\mathcal{X}$ quasi-converge vers x si l'application $\hat{f}_x : E_{\mathcal{X}} \rightarrow X$ est épicontinue.

Cette notion de filtre quasi convergent coïncide avec la définition 1.1. § I chap. I. (cf [3] bis).

c) Dans [3] bis, il est établi qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'une application f entre deux espaces épitopologiques X et Y soit épicontinue (= quasi continue) est que f transforme tout filtre quasi-convergent en un filtre quasi-convergent.

Proposition 3.2. : La structure canonique de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^{\#}}(X, Y)$, conséquence de la fermeture de $\tilde{\mathcal{T}}^{\#}$, coïncide avec la quasi-topologie de la convergence locale définie en 2.5. § I.

Puisque $\tilde{\mathcal{T}}^{\#}$ est une catégorie fermée, l'application d'évaluation

$$EV : \text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^{\#}}(X, Y) \times X \longrightarrow Y$$

où $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^{\#}}(X, Y)$ est muni de sa bonne structure, doit être épicontinue. En vertu de la condition nécessaire et suffisante exprimée précédemment, ceci revient à dire que l'image par EV d'un filtre $(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ quasi convergent de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^{\#}}(X, Y) \times X$ doit être un filtre quasi-convergent de Y, ce qui est équivalent à dire que $\mathcal{F}$ quasi-converge sur $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^{\#}}(X, Y)$ suivant la quasi-topologie de la convergence locale λ .

Les résultats du chapitre II peuvent être généralisés: Soit $(\mathcal{T}', V')$ une catégorie d'ensembles structurés fermée telle qu'il existe un plongement pleinement fidèle de $\mathcal{T}$ dans $\mathcal{T}'$ commutant avec V et V'. Si E et F sont des espaces vectoriels topologiques, la structure canonique de $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{T}}(E, F)$ induit sur $\mathcal{L}(E, F)$ (ensemble des applications linéaires continues de E dans F) une structure telle que les applications

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{L}(E, F) \times \mathcal{L}(F, G) \longrightarrow \mathcal{L}(E, G) \\ \mathcal{L}(E, F) \times E \longrightarrow F \end{array} \right.$$

sont des morphismes de $\mathcal{T}'$. Ceci permet de définir une notion de différentiabilité dans la catégorie des espaces vectoriels topologiques considérée comme sous catégorie de $\mathcal{T}'$, notion pour laquelle le théorème de transitivité ponctuelle est valable.

CHAPITRE TROISIEME

Variétés différentiables modelées sur des espaces vectoriels quasi-topologiques et structures fibrées.

1 - Dans la suite, nous considérons les catégories suivantes :

a) la catégorie $P = FL(\tilde{\mathcal{T}})$ c'est à dire la catégorie des flèches de $\tilde{\mathcal{T}}$ où $\tilde{\mathcal{T}}$ est la catégorie avec produits introduits dans le chapitre II. Un objet de P est un triple $((\Omega, \pi_\Omega), f(\Omega', \pi_{\Omega'}))$ où (Ω, π_Ω) et $(\Omega', \pi_{\Omega'})$ sont des espaces quasi-topologiques et f une application quasi continue de Ω dans Ω' . P est une catégorie pour la multiplication suivante ([12] p.15.)

$$((\Omega, \pi_\Omega), f, (\Omega', \pi_{\Omega'})) \cdot ((\Omega', \pi_{\Omega'}), f', (\Omega'', \pi_{\Omega''})) \\ = ((\Omega, \pi_\Omega), f' \circ f, (\Omega'', \pi_{\Omega''})).$$

b) le groupoïde Π des éléments inversibles de P .

c) la sous catégorie Σ^r de P formée des triples $((\Omega, \pi_\Omega), f, (\Omega', \pi_{\Omega'}))$ où Ω (resp. Ω') est un sous-espace d'un espace vectoriel quasi-topologique, ouvert pour la topologie sous-jacente et où f est de classe D^r , $r \geq 0$. $\Sigma^r = FL(\Delta^r)$.

d) si (E, π_E) est un espace vectoriel quasi-topologique, $\Lambda^r(E)$ le sous groupoïde plein de Σ^r ayant pour unité les (Ω, π_Ω) où $\Omega \subset E$ est ouvert pour la topologie $\tau(\pi_E)$ (sous groupoïde des quasi-automorphismes locaux de E). $\Lambda^r(E)$ peut encore être considéré comme un pseudo-groupe.

e) Λ^r le groupoïde des éléments inversibles de Σ^r .

2 - Définition 2.1. : Soit (E, π_E) un espace vectoriel quasi-topologique. On appelle E - variété de classe D^r un couple $X = (X', \mathcal{Q})$ formé d'un ensemble X' et d'un atlas $\mathcal{Q}$ complet et compatible avec $\Lambda^r(E)$.

Une carte de $\mathcal{A}$ est elle-même un couple (g, Ω) où g est une application biunivoque de $\alpha(g)$ sur un sous-espace Ω de E ouvert pour la topologie $\tau(\pi_E)$, $\alpha(g)$ désignant la source de l'application g dans X' .

La topologie sous jacente à $\mathcal{A}$, c'est à dire ayant pour base d'ouverts les ensembles $\alpha(g)$ sera notée τ_X .

La structure quasi-topologique π_E de E induit par transport sur chaque $\alpha(g)$ une structure quasi-topologique d'où l'existence sur X d'une quasi-topologie sous jacente à $\mathcal{A}$, notée π_X . Pour cette quasi-topologie, un filtre $\mathcal{X}$ quasi-converge vers x si et seulement si, (Ω, g) désignant la carte locale en x , $\mathcal{X} \mid \alpha(g)\pi_\Omega x$.

Etant donné X et Y deux variétés de classe D^r , on dira que f est une application de classe D^r de X dans Y s'il existe un atlas $\{(\Omega_i, g_i)\}_{i \in I}$ de X et un atlas $\{(\Omega'_j, g'_j)\}_{j \in J}$ de Y tels que $\forall (i, j)$ l'application

$$g'_j \circ f \circ g_i^{-1} : \alpha(\Omega_i) \longrightarrow \alpha(\Omega'_j)$$

soit de classe D^r au sens de la définition 2.1. du chapitre II. § II; définition qui n'est intéressante que si Y est modelée sur un espace vectoriel quasi-topologique séparé, et qui est indépendante du choix d'atlas sur X et Y sous réserve que les structures définies sur X et Y par ces derniers restent inchangées.

On obtient ainsi une nouvelle catégorie $\tilde{\mathcal{V}}^r$ dont les objets sont les variétés de classe D^r modelée sur les espaces vectoriels quasi-topologiques séparés et les morphismes les applications de classe D^r de X dans Y . $\tilde{\mathcal{V}}^r$ est un catégorie avec produits finis : si X et Y sont deux variétés de classe D^r modelées respectivement sur E et F , $X \times Y$ est une $E \times F$ variété de classe D^r ([4] p. 103).

On peut étendre à $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$ la quasi-topologie δ_r introduite au n°2 § II. Chapitre II et définir la topologie sous-jacente à cette dernière (ou δ_r - topologie) comme la borne supérieure des topologies compatibles avec la structure localement vectorielle de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$ et pour laquelle tout filtre quasi-convergent converge. (Il en existe au moins une, ne serait-ce que la topologie de la convergence simple pour Y muni de la topologie τ_Y).

Toute application quasi-continue de X dans Y est continue pour les topologies τ_X et τ_Y et l'application qui, à tout X de $\tilde{\mathcal{V}}^r$, associe l'ensemble sous-jacent muni de la topologie τ_X apparaît donc comme un foncteur τ de la catégorie $\tilde{\mathcal{V}}^r$ dans la catégorie des espaces topologiques, foncteur qui ne commute pas aux limites puisqu'en général

$$\tau_{X \times Y} < \tau_X \times \tau_Y.$$

Nous avons déjà vu, en particulier, que si on avait une famille d'espaces vectoriels quasi-topologiques, la topologie sous-jacente à la quasi-topologie produit était plus fine que la topologie produit des topologies sous-jacentes.

Rappelons que $\mathcal{V}^r$ désigne la catégorie des variétés de Banach de classe C^r dont les morphismes sont les applications de classe C^r . Si X et Y sont deux objets de $\mathcal{V}^r$, X et Y sont en même temps des objets de $\tilde{\mathcal{V}}^r$. En outre, une application de classe C^r est aussi de classe D^r (remarque n°2. §II. Chapitre II). Il existe donc un plongement fidèle de $\mathcal{V}^r$ dans $\tilde{\mathcal{V}}^r$. Si X est de dimension finie, d'après la même remarque, $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ est isomorphe à $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$. La sous-catégorie de $\mathcal{V}^r$ constituée des variétés de dimension finie est donc une sous-catégorie pleine de $\tilde{\mathcal{V}}^r$. Nous utiliserons ce résultat dans le chapitre VI.

Etant donné une F-variété Y, nous dirons qu'un sous ensemble X de Y est une sous variété de Y si X est une E-variété telle qu'il existe une décomposition de F en un produit E x E où E est fermé dans F pour la topologie $\mathcal{T}(\pi_F)$ et si $g : \alpha(g) \rightarrow \Omega$, $g' : \alpha(g') \rightarrow \Omega'$ désignant des cartes d'un même point respectivement de Y et X, Ω coïncide avec la propriété de Ω sur E et $g|_{\alpha(g')} : \alpha(g') \rightarrow \Omega'$ avec g' .

3 - Définition 3.1. : Soient $X = (X', \mathcal{A})$ et $Y = (Y', \mathcal{B})$ deux objets de $\mathcal{V}^r$, deux morphismes f et f' de X dans Y sont r-équivalents en $x \in X$ si $f(x) = f'(x)$ et, si pour tout entier $i \leq r$, il existe $g \in \mathcal{A}$ et $g' \in \mathcal{B}$ tels que l'on ait :

$$D^i (g' \circ f \circ g^{-1}) (g(x)) = D^i (g' \circ f' \circ g^{-1}) (g(x))$$

Définition 3.2. : Soient f un objet de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ et $J_x^r f$ la r-classe de f en x. On appelle r-jet de X dans Y l'ensemble $J^r(X, Y)$ de toutes les classes d'équivalence $J_x^r f$, x et f décrivant respectivement X et $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$.

Si X et Y sont modelées respectivement sur des espaces vectoriels quasi-topologiques E et F, une r-classe $J_x^r f$ est alors une suite

$$(f(x), D^i f(x))_{i \leq r} \in F \times \prod_{i \leq r} \mathcal{L}^i(E, F).$$

Définition 3.3. Soit X une E-variété, un élément de $J^1(R, X)$ ayant pour but $x \in X$ et pour origine $O \in R$ sera appelé vecteur tangent d'origine x. L'ensemble $T_x(X)$ des vecteurs tangents d'origine x constitue l'espace tangent à X en x.

$$T_x(X) \text{ est isomorphe à } E. \text{ On pose } T(X) = \bigcup_{x \in X} T_x(X).$$

$4 - P_0$ (resp Σ_0^r) désigne l'ensemble des unités de P (resp. Σ^r)

Définition 4.1. : $(G, \pi_G) \in P_0$ (resp Σ_0^r) sera appelé groupe d'opérateurs de classe P (resp Σ^r) sur $(Y, \pi_Y) \in P_0$ (resp. Σ^r) si

(i) G est un groupe multiplicatif tel que

$((G \times G, \pi_G \times \pi_G), C, (G, \pi_G)) \in P$ (resp Σ^r) où C désigne l'application $(s, s') \longrightarrow s \cdot s'$.

(ii) G est un groupe d'opérateurs sur Y tel que l'application $(s, y) \rightarrow s \cdot y$ de $(G \times Y, \pi_G \times \pi_Y)$ dans (Y, π_Y) appartienne à P (resp Σ^r).

Supposons que (G, π_G) soit un groupe d'opérateurs de classe P (resp. Σ^r) sur (Y, π_Y) et appelons $\tilde{\Phi}(Y, G, \pi)$ (resp. $\tilde{\Phi}(Y, G, \Lambda^r)$) le pseudo-groupe formé des quasi-homéomorphismes

$((\Omega_1 \times Y, \pi_{\Omega_1} \times \pi_Y), \varphi, (\Omega_2 \times Y, \pi_{\Omega_2} \times \pi_Y)) \in \Pi$ (resp. Λ^r)

tels que

$\varphi(x, y) = (h(x), s_x \cdot y)$, $s_x \in G$ dépendant quasi-continûment (resp. D^r différenciablement) de x , $((\Omega_1, \pi_{\Omega_1}), h, (\Omega_2, \pi_{\Omega_2})) \in \Pi$ (resp. Λ^r).

Définition 4.1. : On appellera fibré quasi-topologique (resp. de classe D^r) un couple $(\tilde{X}, \mathcal{A})$ formé d'un ensemble $\tilde{X}$ et d'un atlas complet sur $\tilde{X}$ compatible avec le pseudo-groupe $\tilde{\Phi}(Y, G, \pi)$ (resp $\tilde{\Phi}(Y, G, \Lambda^r)$). Une carte locale de $\mathcal{A}$ est un couple $(f, (\Omega \times Y, \pi_{\Omega} \times \pi_Y))$ où f est une application biunivoque de

$\mathcal{A}(f) \subset \tilde{X}$ sur $\Omega \times Y$.

Les ensembles $f_x(Y)$ pour $x \in \Omega$, f décrivant α , forment une partition de $\tilde{X}$. L'ensemble quotient de $\tilde{X}$ par la relation d'équivalence correspondante est appelé la base ; on la note X . X est un espace quasi-topologique (resp. une variété de classe D^r) (Voir [4] p.93) et l'application $p : \tilde{X} \rightarrow X$ est quasi continue (resp. de classe D^r).

Dans la suite nous désignerons précisément un fibré par l'application $p : \tilde{X} \rightarrow X$; par variété fibrée, il faudra entendre un espace fibré de classe D^r , $r \geq 0$.

L'espace Y est appelé la fibre ; si cette dernière est un espace vectoriel quasi-topologique, nous appellerons topologie sous jacente $\tau_{\tilde{X}}$ à la structure vectorielle fibrée quasi-topologique (resp. de classe D^r) de $\tilde{X}$ la topologie admettant pour base les ensembles $\Omega \times \Omega'$ où Ω' est ouvert dans Y pour la topologie $\tau(\tau_Y)$.

REMARQUE : Nous pourrions définir une fibration de classe D^r par la donnée d'un triple $(\tilde{X}, X, p)$ où $\tilde{X}$ et X sont des variétés de classe D^r , p une application surjective de classe D^r jouissant de la propriété suivante :

"Pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert Ω de x pour la topologie τ_X , une variété Y et un isomorphisme φ de $p^{-1}(\Omega)$ sur $\Omega \times Y$ tel que $p(\varphi^{-1}(x,y)) = x$ pour tout $x \in \Omega$ et tout $y \in Y$ ".

Considérons un espace fibré quasi-topologique défini de cette manière. Nous pouvons lui associer un fibré quasi-topologique au sens de 4.1. comme suit. Appelons QAUTY le groupe des quasi-automorphismes (de classe D^0) de Y ; QAUTY est un groupe quasi-topologique car l'application

$$\begin{aligned} \text{QAUTY} \times \text{QAUTY} &\longrightarrow \text{QAUTY} \\ (s, s') &\longmapsto s \circ s' \end{aligned}$$

est quasi-continue puisqu'elle se factorise ainsi :

$$\begin{array}{ccc}
 \text{QAUTY} & \times & \text{QAUTY} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \mathcal{H}_{\text{om}_{\tilde{\tau}}}(Y, Y) \times \mathcal{H}_{\text{om}_{\tilde{\tau}}}(Y, Y) & \xrightarrow{\Phi_{Y, Y, Y}} & \mathcal{H}_{\text{om}_{\tilde{\tau}}}(Y, Y)
 \end{array}$$

où l'application $\Phi_{Y, Y, Y}$ est quasi-continue (cf. le théorème 2.8. ,

§ I. Chapitre II et la prop. 2.5. Chap I). QAUTY opère alors quasi-continûment sur Y et le triple $(\tilde{X}, X, p)$ est un fibré quasi-topologique au sens de 4.1.

Etant donné deux fibrés quasi-topologiques (resp. de classe D^r) $p : \tilde{X} \rightarrow X$ et $p' : \tilde{Y} \rightarrow Y$, un morphisme du premier vers le second est une paire, $(\tilde{f}, f)$ d'applications quasi-continues (resp. de classe D^r) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
 \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{Y} \\
 p \downarrow & & \downarrow p' \\
 X & \xrightarrow{f} & Y
 \end{array}$$

Les fibrés quasi-topologiques (resp. de classe D^r) forment une catégorie $\mathcal{F}^r$ pour ces morphismes. Comme dans le cas topologique, on définirait les classes d'isomorphie de fibrés vectoriels quasi-topologiques (resp. de classe D^r).

Nous donnerons au chapitre V une définition plus précise des morphismes de fibrés vectoriels.

Théorème 4.3. : Soient X et Y deux objets de $\tilde{\mathcal{B}}^r$, l'ensemble $J^k(X, Y)$ est muni d'une structure de variété fibrée de classe D^{r-k} de base $X \times Y$ si $k \leq r$, $r < \infty$, d'une structure de variété fibrée de classe D^∞ de même base si $r = \infty, \forall k$,

Pour la démonstration, Voir [4] p. 107.

Corollaire 4.4. : Si X est une E-variété de classe D^r , $T(X)$ est muni d'une structure d'espace fibré de classe D^{r-1} de base X, de fibre E. L'application p est de classe D^{r-1}

5 - Il existe une notion duale à la notion de fibré tangent à une E-variété X de classe D^r . Un élément de $J^1(X, \mathbb{R})$ d'origine x et de but 0 sera appelé vecteur cotangent ; l'ensemble des vecteurs cotangents d'origine x sera noté $T_x^*(X)$. Par définition, on pose :

$$T^*(X) = \bigcup_{x \in X} T_x^*(X).$$

Soit E_x^* la fibre de $T^*(X)$ au-dessus de $x \in X$ et soit $E'_x = \mathcal{L}_\lambda(E_x^*, \mathbb{R})$. Un élément du produit tensoriel

$$\left(\bigotimes^p E_x^* \right) \otimes \left(\bigotimes^q E'_x \right)$$

sera appelé tenseur de type (p, q) sur X d'origine x.

Théorème 5.1. : L'ensemble des tenseurs de type (p, q) sur une variété X de classe D^r admet une structure fibré de classe D^{r-1} .

Pour la démonstration, Voir [4] .

Définition 5.2. : Etant donné un fibré quasi-topologique (resp. de classe D^r) $\tilde{X}$ de base X , on appelle section quasi-continue (resp. de classe D^r) une application γ de classe D^r de X dans $\tilde{X}$ telle que $p \circ \gamma = \text{id}_X$ où p désigne l'application $\tilde{X} \rightarrow X$. En particulier, on appellera section nulle l'injection $X \rightarrow \tilde{X}$.

Un champ de tenseurs de type (p, q) est une section du fibré défini dans le théorème 5.1.

Définition 5.3. : Etant donné un fibré quasi-topologique (resp. de classe D^r) $p : \tilde{Y} \rightarrow Y$ et f une application quasi-continue (resp. de classe D^r) d'un espace quasi-topologique X (resp. d'une variété X de classe D^r) dans Y , on appelle image réciproque du fibré p par l'application f le produit fibré $f \wedge p$. On le note encore $f^* \tilde{Y}$.

f est continue pour les topologies τ_X et τ_Y ; et si la fibre de $\tilde{Y}$ est vectorielle, l'application $p^* : f^* \tilde{Y} \rightarrow X$ est une fibration vectorielle quasi-continue (resp. de classe D^r) dont la fibre $(f^* \tilde{Y})_x$ au-dessus de $x \in X$ peut être identifiée à la fibre de $\tilde{Y}$ au-dessus de $f(x)$.

Dans le chapitre suivant, nous ferons intervenir l'espace $\Gamma(f^* \tilde{Y})$ des sections quasi-continues (resp. de classe D^r) du fibré p^* .

CHAPITRE QUATRIEME

Structure de l'ensemble des morphismes d'un objet dans un autre dans la catégorie $\tilde{\mathcal{V}}^r$.

Dans la suite, Y désignera une variété de classe D^r , $r \geq 1$, objet de $\tilde{\mathcal{V}}^r$. Nous noterons quelquefois (s'il n'y a pas d'ambiguïté) de la même façon l'ensemble $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$ muni de sa structure différentiable (quand elle existe) et l'ensemble sous-jacent.

1 - Définition 1.1. : On dira que Y possède une fonction exponentielle généralisée de classe D^{r-1} s'il existe un quasi-homéomorphisme de classe D^{r-1} d'un voisinage de la section nulle de TY ouvert pour la topologie $\mathcal{T}_{TY}$ définie au n°4. Chapitre III muni de la quasi-topologie induite sur un voisinage W de la diagonale de $Y \times Y$ ouvert pour la topologie $\mathcal{T}_Y \times \mathcal{T}_Y$ muni de la quasi-topologie produit induite. Un tel quasi-homéomorphisme sera noté exp_W .

EXEMPLES : Si Y admet une fonction exponentielle au sens de Lang-Abraham (cf [1] et [16]), cette dernière est une fonction exponentielle généralisée au sens de la définition 1.1. Dans [1] et [16], l'existence d'une fonction exponentielle est liée à la notion de "spray", dans [9] - exposé 1 à la théorie des connexions et des voisinages tubulaires. Dans la suite, chaque fois que nous parlerons d'une fonction exponentielle de classe D^{r-1} (resp. de classe C^{r-1}), il faudra entendre fonction exponentielle généralisée au sens de la définition 1.1. (resp au sens de "Lang-Abraham". [1] et [16]).

2 - Pour décrire la structure différentiable de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$ nous devons utiliser une notion plus fine que la notion de variété de classe D^r donnée au n°2. Chapitre III. Soit E un espace vectoriel quasi-topologique ; introduisons l'ensemble $\tilde{\Lambda}^r(E)$ des quasi-homéomorphismes $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ de classe D^r où $\mathcal{F}$ (resp $\mathcal{F}'$) appartient à un filtre $\mathcal{X}$ (resp. $\mathcal{X}'$) de E convergent vers x (resp. $f(x)$) pour la topologie $\tilde{\mathcal{T}}(\pi_E)$, $\mathcal{F}$ (resp $\mathcal{F}'$) étant muni de la quasi-topologie induite.

$\tilde{\Lambda}^r(E)$ est un ~~para~~-groupe.
para -

Définition 2.1. : Nous appellerons E-quasi-variété différentiable de classe D^r un couple $X = (X, \mathcal{A})$ formé d'un ensemble X et d'un atlas $\mathcal{A}$ complet compatible avec $\tilde{\Lambda}^r(E)$.

La définition 2.1. ne présente d'intérêt que si la quasi-topologie π_E est séparée.

Une E - variété de classe D^r (cf. 2-Chapitre III) est une E-quasi variété de même classe.

De la même façon qu'au n° 2 chapitre III, nous définissons les morphismes d'une quasi-variété différentiable X dans une quasi-variété différentiable Y , ce qui est ici possible puisque la notion de différentiabilité a été définie sur un sous-espace quelconque d'un espace vectoriel quasi-topologique.

Théorème 2.2. : Soient X et Y deux variétés de classe D^0 . Si la F-variété Y de classe D^1 admet une fonction exponentielle généralisée de classe D^0 , $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{Y}}_0}(X, Y)$ possède une structure de quasi-variété topologique (= quasi-variété de classe D^0).

Etant donné une application f fixée de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{Y}}_0}(X, Y)$, appelons $\mathcal{U}_f^W$ l'ensemble inclus dans $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{Y}}_0}(X, Y)$ défini de la façon suivante : $\mathcal{U}_f^W$ est constitué des applications g quasi-continues, telles que $(f(x), g(x)) \in W, \forall x \in X$, W désignant le voisinage de la diagonale de $Y \times Y$ pour la topologie $\tau_Y \times \tau_Y$, sur lequel la fonction $\exp_W^{-1}$ introduite dans 1-1 est définie. L'application

$$H_f : \mathcal{U}_f^W \longrightarrow f \times \mathcal{U}_f \longrightarrow \text{Hom}_{\tilde{\mathcal{Y}}}(X, \mathbb{T}Y)$$

$$g \rightsquigarrow (f, g) \rightsquigarrow \exp_W^{-1} \circ (f, g)$$

où $\exp_W^{-1} \circ (f, g)$ désigne l'application

$$x \rightsquigarrow \exp_W^{-1} \circ (f(x), g(x)),$$

envoie biunivoquement $\mathcal{U}_f^W$ sur $H_f(\mathcal{U}_f^W) = \Omega_f \subset \text{Hom}_{\tilde{\mathcal{Y}}}(X, \mathbb{T}Y)$

Soit maintenant l'image réciproque $f^* TY$ du fibré TY par l'application f ; la fibre de $f^* TY$ au-dessus de x est obtenue en transportant la fibre $F_{f(x)=y}$ de TY au-dessus de x . Dans ce transport, si la fibre de $f^* TY$ est munie de la topologie $\tau(\pi_f), \Omega_f$ s'identifie à un voisinage ouvert de $H_f(f)$ dans $\Gamma(f^* TY)$ pour la topologie de la convergence uniforme, où $\Gamma(f^* TY)$ représente l'espace vectoriel des sections quasi-continues de $f^* TY$. Munissons $\Gamma(f^* TY)$ de la quasi-topologie de la convergence locale λ ; soit $\Gamma_\lambda(f^* TY)$ l'objet de $\mathcal{T}$ ainsi obtenu. Ω_f appartient, au filtre des voisinages de $H_f(f)$ pour la topologie de la convergence uniforme, filtre qui converge puisqu'il est plus fin que le filtre des voisinages de $H_f(f)$ pour la topologie sous-jacente de $\Gamma_\lambda(f^* TY)$.

Dans ces conditions, $\text{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y)$ sera une quasi-variété de classe D^0 dont une carte locale au point f est un couple $(H_f, (\mathcal{U}_f^W, \lambda \mid \Omega_f))$ si on parvient à montrer que les changements de cartes sont de classe D^0 . Soient donc $(H_f, \mathcal{U}_f^W), (H_{f'}, \mathcal{U}_{f'}^{W'})$ deux cartes locales telles que $\mathcal{U}_f^W \cap \mathcal{U}_{f'}^{W'} \neq \emptyset$. L'application $\exp_W^{-1} \circ \exp_{W'}$ induit un quasi-automorphisme local k objet de $\Lambda^0(F)$ (on pourrait encore dire qu'elle est verticalement de classe D^0); le changement de cartes sera alors de classe D^0 si l'application

$$k_* : \Gamma_\lambda(\tilde{U}) \longrightarrow \Gamma_\lambda(f'^* TY)$$

$$\delta \rightsquigarrow k \circ \delta$$

est de classe D^0 où $\tilde{U}$ est un voisinage ouvert de X dans $f^* TY$ pour la topologie $\tau_{f^* TY}$ et où k_* est induite par l'application k .

Or c'est une conséquence de la proposition suivante appliquée au cas où $g = k$ est fixé avec $H = G = F$, avec $U = \alpha(k)$.

Proposition 2.3. : L'application

$$\tilde{\Phi}_{X, Y, G} : (g, f) \rightsquigarrow g \circ f$$

de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}}(U, G) \times \text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}}(X, U)$ dans $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}}(X, G)$ où H et G sont des espaces vectoriels quasi-topologiques et U un ouvert de H pour la topologie $\mathcal{T}(\pi_H)$, est quasi-continue

Puisque $\tilde{\mathcal{T}}$ est une c.e.s. fermée, cette proposition est conséquence de la proposition 5.2. du chapitre I.

Remarquons, enfin, pour achever la démonstration du théorème 2.2. que la quasi-topologie de la convergence locale sur $\Gamma_\lambda(f^*TY)$ est séparée.

Corollaire 2.4. : Si X est compacte et si Y possède une fonction exponentielle généralisée de classe D^0 , la structure quasi-topologique de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^0}(X, Y)$ est une structure canonique).

Ω_f est, en effet, un voisinage ouvert de $H_f(f)$ pour la topologie de la convergence locale, cette dernière coïncidant alors avec la topologie de la convergence uniforme. $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^0}(X, Y)$ est alors une variété quasi-topologique et le corollaire est conséquence du théorème 2.8. du § I du chapitre II.

Théorème 2.4. : Soit X une variété différentiable de classe D^r , $r \geq 1$. Si Y , supposée de classe D^{r+1} , admet une fonction exponentielle généralisée de classe D^r , $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{T}}^r}(X, Y)$ possède une structure de quasi-variété de classe D^0 .

Toutes les applications sont de classe D^r et la démonstration se conduit comme celle du théorème 2.1. à condition de munir l'espace $\Gamma(f * TY)$ des sections de classe D^r de $f * TY$ de la quasi-topologie δ_2 . Notons $\Gamma_{\delta_n}(f * TY)$ l'espace ainsi obtenu. Le résultat du théorème 2.4. est valable même pour $r = \infty$. Dans ce cas, $\Gamma_{\delta_\infty}(f * TY)$ défini par l'égalité

$$\Gamma_{\delta_\infty}(f * TY) = \bigcap_{k=0}^{\infty} \Gamma_{\delta_k}(f * TY)$$

apparaît comme une limite projective (cf. la définition 1.8. § II Chapitre II.) qui appartient encore à $\tilde{E}$.

EXEMPLE : Soient X et Y deux variétés de Banach de classe C^∞ ; X sera supposée localement compact dénombrable à l'infini, Y de dimension un; on supposera, en outre, que Y admet une fonction exponentielle de classe C^∞ . Ecrivons X sous la forme

$X = \bigcup_n K_n$. Soit $f \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y)$; $\text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y)$ est isomorphe à $\text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y)$ au sens ensembliste en vertu de 2 - chapitre III.

Pour toute fonction $\gamma \in \Gamma(f * TY)$, posons :

$$p_{n,r}(\gamma) = \sup_{x \in K_n} |D^{(r)} \gamma(x)|$$

Les $p_{n,r}$ sont des semi-normes sur $\Gamma(f * TY)$ et définissent sur cet espace une topologie localement convexe métrisable et complète (voir [8] p.89) qui fait de $\Gamma(f * TY)$ un espace de Fréchet.

$\text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y)$ et, par conséquent, $\text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y)$ possède ainsi une structure de quasi-variété de classe D^0 modélée sur un espace de Fréchet.

En réalité, à l'aide de la proposition 2.6. établie ultérieurement, nous pourrions exprimer un résultat plus fort (quasi-variété de classe D^∞) et au chapitre VI, nous verrons que la topologie d'espace de Fréchet de $\Gamma(f * TY)$ coïncide avec la topologie de la convergence compacte qui coïncide elle-même avec la quasi-topologie δ_∞ .

Théorème 2.5. : Soient X et Y deux variétés différentiables de classe D^∞ . Si Y possède une fonction exponentielle généralisée de classe D^∞ , $\text{Hom}_{\mathcal{V}}^\infty(X, Y)$ admet une structure de quasi-variété différentiable de classe D^∞ .

Compte-tenu du théorème 2.4., montrons que des changements de cartes sont de classe D^∞ . A cet effet, reprenons les démonstrations et notations du théorème 2.2.; montrons que la fonction k automorphisme local de classe D^∞ de la fibre F de TY induit une application

$$k_* : \Gamma_{\delta_\infty}^1(\tilde{U}) \longrightarrow \Gamma_{\delta_\infty}^1(f'^* TY)$$

de classe D^∞ . Or c'est une conséquence de la proposition suivante appliquée au cas où $g = k$ avec $H = G =$ fibre de TY.

Proposition 2.6. : Si X désigne une variété de classe D^∞ , G et H des espaces vectoriels quasi-topologiques, U un ouvert de H pour la topologie $\tau(\pi_H)$, l'application

$$\begin{aligned} \Phi_{X, U, G} : \text{Hom}_{\mathcal{V}}^\infty(X, U) \times \text{Hom}_{\mathcal{V}}^\infty(U, G) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{V}}^\infty(X, H) \\ (f, g) &\rightsquigarrow g \circ f \end{aligned}$$

où les espaces $\text{Hom}_{\mathcal{V}}^\infty(\dots)$ sont munis de la quasi-topologie δ_∞ , est de classe D^∞ .

confer le corollaire 2.14. du chapitre II.

Corollaire 2.7. : Sous les hypothèses du théorème 2.5., l'application d'évaluation

$$\begin{aligned} \text{Ev} : \text{Hom}_{\mathcal{V}}^\infty(X, Y) \times X &\longrightarrow Y \\ (f, x) &\rightsquigarrow f(x) \end{aligned}$$

où $\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, Y)$ est muni de sa structure de quasi-variété différentiable, est de classe D^∞ .

Ceci revient à établir que $V(i, j)$, l'application

$$\text{Ev}_{ij}^f : \Omega_f \times X_i \longrightarrow Y_j$$

est de classe D^∞ , X_i, Y_j, Ω_f représentant respectivement des cartes locales de $X, Y, \text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, Y)$ aux points $x, f(x), f$. Or Ω_f est un sous-espace de $\Gamma_{\delta_\infty}(f^*TY)$ muni de la quasi-topologie induite et l'application Ev_{ij}^f se factorise de la manière suivante où F est la fibre de TY :

$$\begin{array}{ccc} \Omega_f \times X_i & \xrightarrow{\text{Ev}_{ij}^f} & Y_j \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathcal{H}_{0,1} \Delta_\infty(X_i, F) \times X_i & & \end{array}$$

En vertu du théorème 2.12. Chapitre II. § II, Ev_{ij}^f est donc de classe D^∞ .

Corollaire 2.7' : Si X est compacte et si Y possède une fonction exponentielle généralisée de classe D^∞ , la structure différentiable de classe D^∞ de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, Y)$ est une structure canonique.

L'ouvert Ω_f pour la topologie de la convergence uniforme (cf démonstration du théorème 2.2.) est alors un ouvert pour la topologie sous-jacente de $\Gamma_{\delta_\infty} f^*TY$, cette dernière coïncidant avec la topologie de la convergence uniforme.

$\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, Y)$ est donc une variété (pas seulement une quasi-variété) de classe D^∞ . Compte tenu du corollaire 2.7., il suffit d'établir pour tout objet Z de $\mathcal{V}^\infty$, à une application $Z \times X \rightarrow Y$ de classe D^∞ , il correspond une application de classe D^∞ de Z dans $\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, Y)$ muni de sa structure différentiable. Or ceci s'établit de la même façon que pour le théorème 2.12. Chap. II. § II.

Théorème 2.8. : Soient X une variété quasi-topologie, Y une F-Variété différentiable de classe D^1 . Si Y possède une fonction exponentielle généralisée de classe D^1 , $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, Y)$ admet une structure de quasi variété différentiable de classe D^1 .

Comme dans le théorème 2.2., il suffit, là encore, d'établir que les changements de cartes sont de classe D^1 .

Introduisons, comme dans le théorème 2.2., la fonction k automorphisme local de classe D^1 de la fibre F de TY et montrons qu'elle induit une application k_* de classe D^1 de $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, U)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, F)$ muni de la quasi-topologie λ , où $U = \alpha(k)$ est ouvert dans F pour la topologie $\tau(\pi_F)$.

Considérons l'application Δk_* de $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, U) \times \mathbb{R} \times \text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, U)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, F)$ définie par :

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta k_*(\gamma, t, \varphi) &= \frac{k \circ (\gamma + t\varphi) - k \circ \gamma}{t} - \text{Ev} \circ [k' \circ \gamma, \varphi] \text{ pour } t \neq 0 \\ \Delta k_*(\gamma, 0, \varphi) &= 0 \end{aligned} \right.$$

où $\text{Ev} \circ [k' \circ \gamma, \varphi]$ est la fonction composée suivante :

$$X \longrightarrow X \times X \xrightarrow{k' \circ \gamma \times \varphi} \mathcal{L}_\lambda(F, F) \times F \xrightarrow{\text{Ev}} F.$$

L'application : $\varphi \longrightarrow \text{Ev} \circ [k' \circ \gamma, \varphi]$ de $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, F)$

dans $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, F)$ est linéaire. Elle est aussi quasi-continue, car si $\mathcal{D}$ désigne un filtre de $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, F)$ tel que $\mathcal{D} \lambda \varphi$, alors

$$\text{Ev} \circ [k' \circ \gamma, \mathcal{D}] \lambda \text{Ev} \circ [k' \circ \gamma, \varphi]$$

En effet, $\mathcal{D} \lambda \varphi$ est équivalent à " $\mathcal{X} \pi_X \times \implies \mathcal{D}(\mathcal{X}) \pi_F \varphi(x)$ " et

$$\mathcal{D}(\mathcal{X}) \pi_F \varphi(x) \implies \text{Ev} \circ (k' \circ \gamma(\mathcal{X}), \mathcal{D}(\mathcal{X})) \pi_F \text{Ev} \circ (k' \circ \gamma(x), \varphi(x))$$

$$\text{Ev} \circ (k' \circ \gamma, \mathcal{D})(\mathcal{X}) \pi_F \text{Ev} \circ (k' \circ \gamma, \varphi)(x),$$

en vertu de la quasi-continuité de l'application d'évaluation.

Donc : $\mathcal{X} \pi_X x \implies \text{Ev} \circ (k' \circ \delta, \mathcal{N}^0) (\mathcal{X}) \pi_F \text{Ev} \circ (k' \circ \delta, \varphi)(x)$.

Mais par définition de la quasi-topologie λ , ceci implique

$$\text{Ev} \circ (k' \circ \delta, \mathcal{N}^0) \lambda \text{Ev} \circ (k' \circ \delta, \varphi)$$

Finalement : $\mathcal{N}^0 \lambda \varphi \implies \text{Ev} \circ (k' \circ \delta, \mathcal{N}^0) \lambda \text{Ev} \circ (k' \circ \delta, \varphi)$

Reste alors à montrer la quasi-continuité de l'application Δk_* .

Soient $\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{N}$ des filtres respectivement de $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^0}(X, U)$, $\mathbb{R}$, $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^0}(X, U)$.

Nous devons montrer que $\mathcal{F} \lambda \delta, \mathcal{H} \pi_{\mathbb{R}} t, \mathcal{N} \lambda \varphi$ entraînent :

$$\Delta k_* (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{N}) \lambda \Delta k_* (\delta, t, \varphi)$$

Or, $\mathcal{F} \lambda \delta$ si et seulement si : $\mathcal{X} \pi_X x \implies \mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F \delta(x)$ et $\mathcal{N} \lambda \varphi$ si et seulement si : $\mathcal{X} \pi_X x \implies \mathcal{N}(\mathcal{X}) \pi_F \varphi(x)$. Donc, sous les hypothèses $\mathcal{F} \lambda \delta$ et $\mathcal{N} \lambda \varphi$,

$$\mathcal{X} \pi_X x \implies \mathcal{F}(\mathcal{X}) \pi_F \delta(x) \text{ et } \mathcal{N}(\mathcal{X}) \pi_F \varphi(x).$$

Mais en vertu de la différentiabilité de k , l'application Δk définie par

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta k \circ (\delta(x), t, \varphi(x)) = \frac{k \circ (\delta(x) + t\varphi(x)) - k \circ \delta(x)}{t} - \text{Ev} [k \circ \delta(x), \varphi(x)] \\ \Delta k \circ (\delta(x), 0, \varphi(x)) = 0 \end{array} \right.$$

est quasi-continue. Donc :

$$\mathcal{X} \pi_X x \implies \Delta k \circ (\mathcal{F}(\mathcal{X}), \mathcal{H}, \mathcal{N}(\mathcal{X})) \pi_F \Delta k \circ (\delta(x), t, \varphi(x)),$$

$$\text{soit : } \mathcal{X} \pi_X x \implies \Delta k \circ (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{N})(\mathcal{X}) \pi_F \Delta k \circ (\delta, t, \varphi)(x)$$

et en vertu de la définition de la quasi-topologie de la convergence locale, cette implication est équivalente à

$$\Delta k_* (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{N}) \lambda \Delta k_* (\delta, t, \varphi).$$

Théorème 2.9. : Soient X une E-variété de classe D^r , $r \geq 1$. Y une F-variété de classe D^{r+1} . Si Y possède une fonction exponentielle généralisée de classe D^{r+1} , $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$ admet une structure de quasi-variété différentiable de classe D^1 .

Ce théorème, généralisation du théorème 2.8. est une conséquence du lemme suivant :

Lemme 2.10. : Soit F un espace vectoriel quasi-topologie, si k est une application de classe D^{r+1} d'un ouvert U de F pour la topologie $\tau(\pi_F)$, k induit une application k_* de classe D^1 de $\text{Hom}_{\tilde{\tau}^r}(X, U)$ muni de la quasi-topologie δ_r dans $\text{Hom}_{\tilde{\tau}^r}(X, F)$ muni de la même quasi-topologie.

Reprenant la démonstration du théorème 2.8., nous devons montrer que $\mathcal{F} \delta_r \mathcal{G}, \mathcal{H} \pi_{\mathbb{R}^t}, \mathcal{A} \delta_r \mathcal{C}$ entraînent :

$$\Delta k_* (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{A}) \delta_r \Delta k_* (\mathcal{G}, t, \mathcal{C})$$

Or, en vertu de la définition de la δ_r quasi-topologie,

$\Delta k_* (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{A}) \delta_r \Delta k_* (\mathcal{G}, t, \mathcal{C})$ est équivalent à l'ensemble des deux propriétés suivantes (1) et (2) que nous établissons ;

(1) $\Delta k_* (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{A}) \lambda \Delta k_* (\mathcal{G}, t, \mathcal{C})$ ce qui a déjà été établi dans la démonstration du théorème 2.7. puisque $\mathcal{F} \delta_r \mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{A} \delta_r \mathcal{C}$) implique d'abord $\mathcal{F} \lambda \mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{A} \lambda \mathcal{C}$).

(2) $D^{(i)} \Delta k_* (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{A}) \lambda D^{(i)} \Delta k_* (\mathcal{G}, t, \mathcal{C})$ dans $\text{Hom}_{\tilde{\tau}^0}(X, \mathcal{L}_\lambda(E^i, F))$.

$$\forall i \leq r, \text{ soit : } D^{(i)} \Delta k_* (\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{A}) \lambda D^{(i)} \Delta k_* (\mathcal{G}, t, \mathcal{C}).$$

Or, $\mathcal{F} \delta_r \mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{A} \delta_r \mathcal{C}$) implique $D^{(i)} \mathcal{F} \lambda D^{(i)} \mathcal{G}$ (resp. $D^{(i)} \mathcal{A} \lambda D^{(i)} \mathcal{C}$) dans $\text{Hom}_{\tilde{\tau}^0}(X, \mathcal{L}_\lambda(E^i, F))$ et $D^{(i)} \mathcal{F} \lambda D^{(i)} \mathcal{G}$ (resp. $D^{(i)} \mathcal{A} \lambda D^{(i)} \mathcal{C}$) implique à son tour la relation :

$$" \mathcal{F}_x \longrightarrow D^{(i)} \mathcal{F} (\mathbb{E}) \pi_{\mathcal{L}_\lambda(E^i, F)} D^{(i)} \mathcal{G}(x)$$

$$(\text{resp. } D^{(i)} \mathcal{A} (\mathbb{E}) \pi_{\mathcal{L}_\lambda(E^i, F)} D^{(i)} \mathcal{C}(x))" \quad \forall i \leq r.$$

Cette relation donne :

$$D^{(i)} \Delta k \circ (\mathcal{F}, \mathcal{K}, \mathcal{A}^p) \lambda D^{(i)} \Delta k \circ (\mathcal{J}, t, \varphi) \text{ pour tout } i \leq r.$$

Il ne reste plus alors qu'à montrer la quasi-continuité de l'application linéaire $\varphi \rightarrow \text{Ev} \circ [k' \circ \mathcal{J}, \varphi]$ de $\text{Hom}_{\mathcal{F}}^r(X, F)$ muni de la quasi-topologie $\delta_{\mathcal{F}}$ dans lui-même, ce qui se fait de façon analogue à partir de la démonstration correspondante du théorème 2.7. en remplaçant la quasi-topologie λ par la quasi-topologie δ_r compte tenu du théorème 2.10. Chap II. § II suivant lequel l'application Ev est de classe D^r .

Le lemme 2.10. est ainsi démontré. On pourrait, d'ailleurs, plus généralement établir de la même façon que si k est une application de classe D^{r+1} , d'un ouvert U d'un espace vectoriel quasi-topologique F dans un autre G, k induit une application k_* de classe D^1 de $\text{Hom}_r(X, U)$ dans $\text{Hom}_r(X, G)$ où les deux espaces $\text{Hom}_r(\dots)$ sont munis de la quasi-topologie δ_r .

Théorème 2.11. : Soit X une variété de classe D^r , Y une variété de classe D^{r+1+s} , $s \geq 1$. Si Y possède une fonction exponentielle généralisée de classe D^{r+s} , $\text{Hom}_r(X, Y)$ admet une structure de quasi variété différentiable de classe D^s .

C'est une généralisation immédiate du théorème précédent .
2.10.

Corollaire 2.11! : Sous les hypothèses du théorème 2.11., l'application

$$\text{Ev} : \text{Hom}_r(X, Y) \times X \rightarrow Y \text{ est de classe } D^s \text{ si } s \leq r.$$

cf. Le corollaire 2.7. compte tenu du théorème 2.10 Chapitre II. §II.

Remarque 2.12. : Sous les hypothèses des théorèmes 2.8. et 2.9., $\text{Hom}_{\mathcal{V}^0}(X, TY)$ (resp. $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, TY)$) muni de la quasi-topologie λ (resp. δ_r) peut être considéré comme le fibre tangent à $\text{Hom}_{\mathcal{V}^0}(X, Y)$ (resp. $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$) dont la fibre au-dessus de f est identifié à $\Gamma_\lambda(f * TY)$ (resp. $\Gamma_{\delta_r}(f * TY)$) ou encore à l'ensemble des applications $\mathcal{S}$ de X dans TY quasi-continues (resp. de classe D^r) telles que si $p : TY \longrightarrow Y$, $p \circ \mathcal{S} = f$, ce dernier ensemble étant muni de la quasi-topologie λ (resp. δ_r).

3 - Théorème 3.1. : Soient X, Y, Z trois variétés de classes respectives D^r, D^{r+1}, D^{r+s+1} , Y et Z possédant des fonctions exponentielles généralisées de classe D^{r+1} . Si h est une application de classe D^{r+s} de Y dans Z , h induit une application

$$h_* : f \longrightarrow h_*(f) = h \circ f$$

de classe D^s de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Z)$. Si $r = \infty$, h_* est de classe D^∞ .

$\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ et $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Z)$ sont alors des quasi-variétés de classe D^s . Soient Ω_f et $\Omega_{h \circ f}$ des cartes locales respectivement aux points f et $h \circ f$. Déterminons $\tilde{U}$ et $\tilde{V}$ par $\Omega_f = \Gamma_{\delta_r}(\tilde{U})$, $\Omega_{h \circ f} = \Gamma_{\delta_r}(\tilde{V})$.

$\tilde{U}$ (resp. $\tilde{V}$) est un voisinage de la section nulle X dans $f * TY$ (resp. $f * h * TZ$) pour la topologie $\tau_{f * TY}$ (resp. $\tau_{f * h * TZ}$). L'application h induit une application de classe D^{r+s} de $\tilde{U}$ dans $\tilde{V}$ qui induit elle-même l'application

$$h_* : \Omega_f = \Gamma_{\delta_r}(\tilde{U}) \longrightarrow \Omega_{h \circ f} = \Gamma_{\delta_r}(\tilde{V})$$

$\downarrow \Gamma_{\delta_r}$
 $(f * h * TZ)$

En vertu du lemme 2.4., h_* est donc de classe D^s . La dernière assertion est conséquence de la proposition 2.6.

. Nous avons une propriété duale de celle du théorème

3.1. Si $h \in \text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y)$, l'application

$$h^* : f \longrightarrow f \circ h = h^*(f)$$

de $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(Y, Z)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Z)$ est de classe D^s et, en ce cas, l'hypothèse Y de classe D^r suffit.

Il existe, d'ailleurs, un résultat plus fort que celui du théorème 3.1. qui réalise la synthèse des résultats précédents. Théorème 3.2. : Outre les hypothèses du théorème 3.1, si Z supposée de classe D^{r+2s+1} admet une fonction exponentielle de classe D^{r+2s} , l'application

$$\Phi_{X,Y,Z} : (f,h) \longrightarrow \text{hof de } \text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{F}^{r+s}}(Y,Z) \dots$$

dans $\text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Z)$ est de classe D^s .

A partir du résultat du théorème 3.2. On retrouve la différentiabilité de classe D^s de l'application

$$\text{Ev} : \text{Hom}_{\mathcal{F}}(X, Y) \times X \longrightarrow Y, \text{ pour } s \leq r.$$

Preuve du théorème 3.2. : Soient $f, g, g \circ f$ des points quelconques respectivement de $\text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Y)$, $\text{Hom}_{\mathcal{F}^{r+s}}(Y,Z)$, $\text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Z)$. Notons

$\mathcal{H}_{\mathcal{F}^{r+s}}(f * TY, f * g * TZ)$ l'ensemble des applications de classe D^{r+s} du fibré $f * TY$ de base X dans la fibré $f * g * TZ$ de même base qui se projettent sur l'identité de X , muni de la quasi-topologie

δ_{r+s} . Si $\Omega_f, \Omega_g, \Omega_{g \circ f}$ sont des cartes locales aux points $f, g, g \circ f$ respectivement pour $\text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Y)$, $\text{Hom}_{\mathcal{F}^{r+s}}(Y,Z)$, $\text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Z)$, démontrer que l'application composition des fonctions de $\Omega_f \times \Omega_g$ dans $\Omega_{g \circ f}$ est de classe D^s revient à montrer que l'application

$$\begin{array}{ccc} f * TY & \xrightarrow{\delta'} & f * g * TZ \\ \delta \uparrow & \nearrow & \\ X & & \end{array}$$

$$(\delta, \delta') \longrightarrow \delta' \circ \delta \text{ de } \Gamma_{\delta_r}(f * TY) \times \mathcal{H}_{\mathcal{F}^{r+s}}(f * TY, f * g * TZ)$$

dans $\Gamma_{\Delta}^s (f^* g^* TZ)$ est de classe D^s , ce qui est conséquence du théorème suivant appliqué au cas où $F =$ fibre de TY , $G =$ fibre de TZ .

théorème 3.3. : L'application $C = \tilde{\Phi}_{X, F, G} : (g, f) \longrightarrow g \circ f$ de $\mathcal{H}om_{\Delta^{r+s}}(F, G) \times \mathcal{H}om_{\Delta^r}(X, F)$ dans $\mathcal{H}om_{\Delta^r}(X, G)$ est de classe D^s .

Le théorème s'établit par récurrence sur s . Démontrons qu'il est vrai pour $s = 1$

$$(t\psi + g) \circ (t\varphi + f) - g \circ f = t [\langle Dg(f), \varphi \rangle + \Delta g(f, t, \varphi)] + t\psi \circ f + t^2 \psi \circ \varphi.$$

Posons donc $DC(g, f) : (\psi, \varphi) \longrightarrow \langle Dg(f), \varphi \rangle + \psi \circ f$. $DC(g, f)$ est une application linéaire de $\mathcal{H}om_{\Delta^{r+s}}(F, G) \times \mathcal{H}om_{\Delta^r}(X, F)$ dans $\mathcal{H}om_{\Delta^r}(X, G)$, quasi-continue, car si $\mathcal{F} \delta_r \varphi, \mathcal{G} \delta_r \psi,$

$D^i \mathcal{F} \lambda D^i \varphi$ et $D^i \mathcal{G} \lambda D^i \psi$ pour $i \leq r$, d'où :

$$D^i [\langle Dg(f), \mathcal{F} \rangle + g \circ f] \lambda D^i [\langle Dg(f), \varphi \rangle + \psi \circ f].$$

Considérons alors l'application ΔC définie par :

$$\begin{cases} \Delta C((g, f), t, (\psi, \varphi)) = \frac{(g+t\psi) \circ (f+t\varphi) - g \circ f}{t} - \langle DC(g, f), (\psi, \varphi) \rangle \\ \Delta C((g, f), 0, (\psi, \varphi)) = 0 \end{cases}$$

si $\mathcal{G} \delta_r g, \mathcal{F} \delta_r f, \mathcal{P} \delta_r \psi, \mathcal{M} \delta_r \varphi, \mathcal{H} \pi_{\mathbb{R}} t,$

$\Delta C(\mathcal{G} \times \mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{P} \times \mathcal{M}) \delta_r \Delta C((g, f), t, (\psi, \varphi))$, ce qui assure la quasi-continuité de l'application ΔC et la différentiabilité de l'application C . De proche en proche, on démontre ainsi que l'application C est de classe D^s .

Remarque : au lieu de $\langle Dg(f), \varphi \rangle$, on pourrait encore noter

Ev. $[g' \circ f, \varphi]$ comme dans le théorème 2.7.

4 - Dans 4, nous allons considérer des F quasi-variétés Y pour lesquelles les ensembles ξ qui ont servi à les définir sont des voisinages pour une certaine topologie (plus fine que $\mathcal{T}(\pi_F)$) non nécessairement compatible avec la structure vectorielle de F et notre ρ_F .

Définition 4.1. Etant donné un F quasi-variété Y, nous dirons qu'un sous-ensemble X de Y est une sous-quasi-variété de Y si X est une E quasi-variété telle qu'il existe une décomposition de F en un produit $E \times E'$ où E est fermée dans F pour ρ_F et si $g : \alpha(g) \longrightarrow \Omega$, $g' : \alpha(g') \longrightarrow \Omega'$ désignant des cartes d'un même point respectivement de Y et X, Ω' coïncide avec la projection de Ω sur E et $g \mid \alpha(g') : \alpha(g') \longrightarrow \Omega'$ avec g' .

Remarque : On pourrait définir le groupe libre $K(X)$ de Grotendiech à partir du monoïde $E(X)$ de la même façon que pour les variétés de classe C^r , $r \geq 0$.

3 - Sur l'ensemble de fibrés vectoriels quasi-topologiques (resp. de classe D^r) de même base, nous pouvons définir d'autres opérations que la somme de Whitney.

a) Le produit tensoriel $\alpha \otimes \beta$ de deux fibrés vectoriels quasi-topologiques (resp. de classe D^r) α et β de même base X sera, par définition, le fibré vectoriel quasi-topologique (resp. de classe D^r) de base X , de fibre au-dessus de $x \in X$ le produit tensoriel $\alpha_x \otimes \beta_x$ des fibres de α et β au-dessus de x .

b) Appelons $\widetilde{\mathcal{F}}_r(X)$ (resp. $\widetilde{\mathcal{F}}(X)$) la catégorie des fibrés vectoriels de classe D^r (resp. quasi-topologiques) de base X . Soient α et β deux objets de $\widetilde{\mathcal{F}}_r(X)$ (resp. $\widetilde{\mathcal{F}}(X)$) de fibres respectives α_x et β_x au-dessus de x ; intéressons-nous aux morphismes de α vers β qui induisent l'identité sur la base. Nous pouvons définir un nouveau fibré vectoriel de classe D^r (resp. quasi-topologique) noté $\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}_r(X)}(\alpha, \beta)$ (resp. $\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}(X)}(\alpha, \beta)$) de base X et dont la fibre au-dessus de x est donnée par

$$(\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}_r(X)}(\alpha, \beta))_x = \mathcal{L}_\lambda(\alpha_x, \beta_x) \quad (\text{resp. } (\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}(X)}(\alpha, \beta))_x = \mathcal{L}_\lambda(\alpha_x, \beta_x))$$

Proposition 3.1. : L'ensemble des sections de $\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}_r(X)}(\alpha, \beta)$ (resp. $\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}(X)}(\alpha, \beta)$) s'identifie à l'ensemble des morphismes de α vers β qui se projettent sur l'identité de X .

En effet, se donner une section de $\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}_r(X)}(\alpha, \beta)$ (resp. $\mathcal{H}_{\widetilde{\mathcal{F}}(X)}(\alpha, \beta)$) revient à se donner, pour tout x de X , une application ℓ_x de $\mathcal{L}_\lambda(\alpha_x, \beta_x)$ c'est à dire, en fait, un morphisme de α vers β qui se projette sur l'identité de X .

Proposition 3.2. : $\underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}_r(X)}(\alpha, \underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}_r(X)}(\beta, \delta))$ (resp. $\underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}(X)}(\alpha, \underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}(X)}(\beta, \delta))$)

est isomorphe à $\underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}_r(X)}(\alpha \oplus \beta, \delta)$ (resp. $\underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}(X)}(\alpha \oplus \beta, \delta)$) (dans la catégorie $\tilde{\Phi}_r(X)$ (resp. $\tilde{\Phi}(X)$)).

Proposition 3.3. : Le foncteur $\underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}_r(X)}(\alpha, \cdot) : \beta \rightarrow \underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}_r(X)}(\alpha, \beta)$ (resp. $\underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}(X)}(\alpha, \cdot) : \beta \rightarrow \underline{\mathcal{H}om}_{\tilde{\Phi}(X)}(\alpha, \beta)$) de $\tilde{\Phi}_r(X)$ (resp. $\tilde{\Phi}(X)$) dans $\tilde{\Phi}_r(X)$ (resp. $\tilde{\Phi}(X)$) est exact à gauche.

La proposition 3.2. est une conséquence de l'isomorphisme suivant dans $\tilde{E}$:

$$\mathcal{L}_\lambda(\alpha_x, \mathcal{L}_\lambda(\beta_x, \delta_x)) \approx \mathcal{L}_\lambda(\alpha_x \times \beta_x, \delta_x) \approx \mathcal{L}_\lambda(\alpha_x \oplus \beta_x, \delta_x)$$

et la proposition 3.3. de la remarque 3.3. du chapitre II - §I

CHAPITRE SIXIEME

Applications

1 - E et F désignant des espaces vectoriels quasi-topologiques, appelons f^r l'application qui, à $x \in E$, associe l'ensemble des jets d'ordre r de $f : E \longrightarrow F$ en x et désignons par $\mathcal{B}^r(E, F)$ l'ensemble des applications f de classe D^r telles que f^r appartienne à $\mathcal{B}(E, J^r(E, F))$. On peut munir $\mathcal{B}^r(E, F)$ de la quasi-topologie la moins fine rendant quasi-continue l'application $f \longrightarrow f^r$ de $\mathcal{B}^r(E, F)$ dans $\mathcal{B}(E, J^r(E, F))$. Si E et F sont des espaces de Banach, la quasi-topologie ainsi défini coïncide avec la topologie de la convergence uniforme des fonctions et de leurs r premières dérivées sur les ensembles bornés (proposition 4.2. § I. Chapitre II.) et si E est de dimension finie, elle coïncide avec la topologie de la convergence compacte que nous rappelons (voir [1] def 16.1. p.52).

Si X et Y sont deux objets de $\mathcal{V}^r$, la topologie de la convergence compacte sur $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ ou C^r topologie est la topologie image réciproque de la topologie de la convergence compacte sur $\text{Hom}(X, J^r(X, Y))$ par l'application $f \longrightarrow f^r$ de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{V}^0}(X, J^r(X, Y))$.

Elle est métrisable dans les deux cas suivants :

1°/ X compact, Y métrisable. Rappelons, par exemple, que si Y est un espace de Banach et X compact, $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ est un espace de Banach si $r < \infty$ (voir [1]), un espace de Fréchet si $r = \infty$.

2°/ X localement compact dénombrable à l'infini (voir [6] p. 34 cf. l'exemple qui suit le théorème 2.4. Chap. IV.)

Si X est une variété de Banach modelée sur un espace vectoriel E de dimension finie donc localement compact et Y une autre variété de Banach modelée sur F , la C^r topologie coïncide avec la quasi-topologie δ_r et par conséquent aussi avec la δ_r -topologie (= topologie sous jacente à la quasi-topologie δ_r définie dans le chapitre III en 2), car $\text{Hom}_{\mathcal{T}}(X \times E^i, F)$ (introduit en 2.5. §.II Chapitre II) coïncide alors avec l'ensemble des applications continues de X dans $\mathcal{L}_\lambda^i(E, F) = \mathcal{L}_b^i(E, F)$ muni de la topologie de la convergence compacte.

Dans le paragraphe 2 suivant, nous utiliserons le théorème 5.4. p.16 de [1] selon lequel, si la base X d'un fibré de Banach est compacte, l'espace de ses sections de classe C^r possède une structure d'espace de Banach : la définition de la norme dépend essentiellement du recouvrement ouvert choisi pour X , mais toutes les normes ainsi déterminées sont équivalentes. La topologie de cet espace de Banach coïncide avec la C^r topologie (et par conséquent aussi avec la quasi-topologie δ_r).

2. Théorème 2.1. : Soient X une variété de classe D^0 et Y une F -variété de Banach de classe C^r , $r \geq 1$, admettant une fonction exponentielle de classe C^0 . Si X est compacte pour la topologie τ_X , $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, Y)$ possède une structure de variété topologique de Banach.

Nous savons déjà que $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, Y)$ possède une structure de variété de classe D^0 (chapitre IV.2) D'autre part, l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, Y)$ des applications quasi-continue de X dans Y est identique à l'ensemble noté $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, Y)$ des applications continues de X dans Y où X est muni de la topologie τ_X . Il est possible de recouvrir $\text{Hom}_{\mathcal{T}^0}(X, Y)$ par des ensembles $\alpha(H_f)$ contenant f où H_f est une bijection de $\alpha(H_f)$ sur un voisinage ouvert de $H_f(f)$ dans $\Gamma_c(f^*TY) = \Gamma_\lambda(f^*TY)$ (cf. le chapitre IV. Théorème 2.3.)

Or, en vertu de la compacité de X pour $\mathcal{T}_X$, $T_c^1(f^*TY)$ est un espace de Banach et, en vertu de la proposition 2.3. du chapitre IV, compte tenu de la remarque 2.9. du chapitre II. §I, si U désigne un ouvert de F et si les espaces $\text{Hom}_{\mathcal{V}_0}(\dots)$ sont munis de la topologie de la convergence compacte, l'application

$$h_* : \text{Hom}_{\mathcal{V}_0}(X, U) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{V}_0}(X, F)$$

induite par une application continue $h : U \longrightarrow F$, est continue. Les changements de cartes sont donc continues et $\text{Hom}'_{\mathcal{V}_0}(X, Y)$ possède ainsi une structure de variété topologique de Banach qui induit une structure de même nature sur $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}_0}(X, Y)$.

Soient maintenant X et Y deux objets de $\mathcal{V}^r$, $r \geq 1$. Munissons l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ de la C^r -topologie ; il en sera ainsi dans la suite du chapitre. Dans le cas où X est compacte, on établirait, en reprenant la démonstration du théorème 2.2. du chapitre IV que, pour $r \neq \infty$, $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ peut être muni d'une structure de variété topologique de Banach si Y est de classe C^{r+1} et possède une fonction exponentielle de classe C^r : pour tout point f de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$, il existe un ensemble $\alpha(H_f) \subset \text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, Y)$ contenant f et une bijection H_f de $\alpha(H_f)$ sur un ouvert de l'espace de Banach $T_{C^r}^1(f^*TY) = T_{\delta_r}^1(f^*TY)$ des sections de classe C^r de f^*TY (l'indice C^r rappelle que la topologie de ce dernier espace est la C^r topologie). En particulier $T_c^1(f^*TY) = T_{C^0}^1(f^*TY)$ et, pour $r = 0$, on retrouve le théorème 1.1. Sous certaines hypothèses cette structure est même différentiable en vertu du théorème suivant qui précise le résultat du chapitre IV selon lequel $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{V}}^r}(X, Y)$ admet une structure de variété de classe D^3 .

Théorème 2.2. : Soient X une variété de Banach compacte de classe C^r et Y une autre variété de Banach de classe C^{r+s+1} , $0 \leq s \leq r < \infty$, admettant une fonction exponentielle de classe C^{r+s} , $\text{Hom}_{\mathcal{J}_r}(X, Y)$ (et par conséquent $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{J}}_r}(X, Y)$) possède alors une structure de variété de Banach de classe C^s (confer. le théorème 2.10 chap.IV)

Compte-tenu de ce qui précède, il suffit de montrer que les changements de cartes sont de classe C^s . Soient donc $(H_f, \mathcal{U}_f^W)$, $(H_{f'}, \mathcal{U}_{f'}^{W'})$ deux cartes locales ; suivant la démonstration et les notations du théorème 2.2. du chapitre IV, ceci revient à établir qu'une application de classe C^{r+s} de la fibre de f^*TY dans celle de f'^*TY induit une application de classe C^s de $\mathcal{T}^{C^r}(f^*TY)$ dans $\mathcal{T}^{C^r}(f'^*TY)$ ce qui résulte du lemme suivant appliqué au cas où k est la fonction qui a été définie dans la fin de la démonstration du théorème 2.2. chapitre IV,

Lemme 2.3. : Soit X une variété de Banach compacte de classe C^r , $r < \infty$, et k une application de classe C^{r+s} d'un ouvert U d'un espace de Banach G dans un autre H, $0 \leq s \leq r$, alors l'application

$$\underline{k_* : \mathcal{J} \longrightarrow k \circ \mathcal{J} = k_* (\mathcal{J})}$$

de $\text{Hom}_{\mathcal{J}_r}(X, U)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{J}_r}(X, H)$ est de classe C^s (confer. le lemme 1.9. Chapitre IV).

Voir [1].

Le théorème 2.2. n'est pas seulement valable pour $s \leq r$. Par exemple, si Y est de classe C^∞ et admet une fonction exponentielle de classe C^∞ , toujours sous l'hypothèse X compact, $\text{Hom}_{\mathcal{J}_r}(X, Y)$ est une variété de Banach de classe C^∞ . ([11] p.47 et [15].) C'est qu'en réalité, le lemme 2.3. est valable sous des hypothèses légèrement moins restrictives.

Théorème 2.4. : Soient X, Y, Z trois variétés de classes respectives $C^r, C^{r+s+1}, C^{r+s+1}$, $0 \leq s \leq r < \infty$, X compacte, Y et Z possédant des fonctions exponentielles de classe C^{r+s} . Une application h de classe C^{r+s} de Y dans Z induit une application

$$h_* : \text{Hom}_{\mathcal{J}^r}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{J}^r}(X, Z)$$

de classe C^s défini par $h_*(f) = h \circ f$ (confer le théorème 3.1. chapitre IV.)

Nous pouvons donner une formulation plus précise que celle du théorème 2.4. comme suit :

" Outre les hypothèses du théorème 2.4., si on suppose que Y est compacte et que Z de classe C^{r+2s+1} admet une fonction exponentielle de classe C^{2r+s} , $0 \leq s \leq r < \infty$, l'application

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{J}^r}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{J}^{r+s}}(Y, Z) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{J}^r}(X, Z) \\ (f, h) & \rightsquigarrow & h \circ f \end{array}$$

est de classe C^s . " (confer Chapitre IV Théor. 3.2.).

Il en résulte, en particulier que l'application d'évaluation

$$\begin{array}{ccc} \text{EV} : \text{Hom}_{\mathcal{J}^r}(X, Y) \times X & \longrightarrow & Y \\ (f, x) & \rightsquigarrow & f(x) \end{array}$$

est de classe C^s , pourvu que $\text{Hom}_{\mathcal{J}^r}(X, Y)$ possède une structure de C^s variété, c'est à dire que les conditions d'application du théorème 2.2. soient réalisées.

Il existe un résultat dual du théorème 2.4. :

"Si X et Y sont compactes et de classe C^r , Z de classe C^{r+s+1} admettant une fonction exponentielle de classe C^{r+s} , une application h de $\text{Hom}_{\mathcal{C}^r}(X, Y)$ induit une application

$$h^* : \text{Hom}_{\mathcal{C}^r}(Y, Z) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}^r}(X, Z)$$

$$f \quad \rightsquigarrow \quad f \circ h$$

de classe C^s .

Etude du cas $r = \infty$:

Tout point f de $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, Y)$ admet alors un voisinage homéomorphe à un ouvert de

$$\Gamma_{\mathcal{C}^\infty}(f^*TY) = \bigcap_{k=0}^{\infty} T_{\mathcal{C}^k}(f^*TY) = T_{\mathcal{C}^\infty}^1(f^*TY).$$

Or $\bigcap_{k=0}^{\infty} T_{\mathcal{C}^k}(f^*TY)$ n'est pas un espace de Banach, mais un espace de Fréchet dont la métrique ρ est donnée par

$$\rho(f, g) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|f - g|_{T_{\mathcal{C}^k}(f^*TY)}}{2^k \left[1 + |f - g|_{T_{\mathcal{C}^k}(f^*TY)} \right]}$$

pour f et $g \in T_{\mathcal{C}^\infty}^1(f^*TY)$, où $| \quad |_{T_{\mathcal{C}^k}(f^*TY)}$

désigne une norme dans $T_{\mathcal{C}^k}^1(f^*TY)$.

En particulier, si X est une variété compacte de Banach, G un espace de Banach, l'espace $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, G)$ possède une structure d'espace de Fréchet.

Dans le cas $r = \infty$, le lemme 2.3. devient :

Lemme 2.3'.: Soient X une variété compacte de Banach, de classe C^∞ et k une application de classe C^∞ d'un ouvert U d'un espace de Banach G dans un autre H, alors l'application

$$k_* : \mathcal{Y} \longrightarrow k \circ \mathcal{Y} = k_* (\mathcal{Y})$$

de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, U)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, H)$ est une application de classe D^∞ .

L'inclusion

$$\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, U) = \bigcap_{k=0}^{\infty} \text{Hom}_{\mathcal{V}^k}(X, U) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, U)$$

est continue pour tout r ($\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, G)$ est la limite projective d'une suite d'espace de Banach), c'est à dire de classe D^r . D'autre part, si k est de classe C^∞ , k est de classe C^{r+s} , $\forall r, s$ finis, $s \leq r$; or, en vertu du lemme 2.3. pour r fini, l'application

$$\mathcal{Y} \xrightarrow{\quad} k \circ \mathcal{Y}$$

de $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, U)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, H)$ est de classe C^s . Donc l'application composée k_*

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, U) & \hookrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, U) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, H) & \hookrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{V}^r}(X, H) \\ & & \mathcal{Y} & \xrightarrow{\quad} & & & k \circ \mathcal{Y} \end{array}$$

est de classe D^s et cela, $\forall s$, c'est à dire est de classe D^∞ .

Le lemme 2.3' peut aussi être considéré comme une conséquence de la proposition 2.6. chapitre IV.

Grâce au lemme 2.3', on voit alors que les changements de cartes sont de classe D^∞ et $\text{Hom}_{\mathcal{V}^\infty}(X, Y)$ possède une structure de variété de classe D^∞ modélisée localement au voisinage de f sur l'espace de Frichet $\Gamma_{C^\infty}^1(f^*TY)$. D'où :

Théorème 2.2' : Si X est une variété banachique compacte de classe C^∞ , Y une autre variété banachique de même classe admettant une fonction exponentielle de classe C^∞ , l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, Y)$ possède une structure de variété de classe D^∞ modélée sur un espace de Fréchet

L'application k_* du lemme 2.3.' est aussi indéfiniment c-différentiable et b-différentiable au sens de [4].

$\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, G)$ (resp. $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, H)$) est un espace localement convexe.

Sa topologie peut donc être définie par un ensemble de semi-normes. Dire que k_* est différentiable en f au sens de Fréchet, c'est dire que quelle que soit la semi-norme β sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, F)$, il existe une semi-norme α sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, G)$ et une application linéaire $Dk_*(f)$ continue de $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, G)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, H)$ telles que

$$\|k_*(f+\varphi) - k_*f - Dk_*(f) \cdot \varphi\|_\beta < \varepsilon(h) \cdot \|\varphi\|_\alpha$$

L'application k_* est indéfiniment différentiable en ce sens, mais cette notion de différentiabilité est plus difficile à manier que la notion de différentiabilité de classe D^1 , car l'application composition

$$\Phi_{E, F, G} : \mathcal{L}_b(E, F) \times \mathcal{L}_b(F, G) \longrightarrow \mathcal{L}_b(E, G)$$

(où b désigne la topologie de la convergence bornée) n'est pas nécessairement continue.

Quant au théorème 2.4., il devient dans le cas $r = \infty$:

Théorème 2.4.1' : Soient X, Y, Z trois variétés de classe C^∞ , X, Y compactes, Y et Z admettant des fonctions exponentielles de classe C^∞ , l'application

$$\begin{array}{ccc} \Phi_{X, Y, Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(Y, Z) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}^\infty}(X, Z) \\ (f, h) & \rightsquigarrow & h \circ f \end{array}$$

est de classe D^∞

Il en résulte, en particulier, que l'application

$$EV : \text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y) \times X \longrightarrow Y$$

$$(f, x) \rightsquigarrow f(x)$$

est de classe D^∞ .

Reprenons l'ensemble des applications (cf. l'exemple chap IV. qui suit le théorème 2.4.) de classe C^∞ d'une variété X de classe C^∞ localement compacte, réunion dénombrable de compacts K_n , dans une variété Y de classe C^∞ admettant une fonction exponentielle de même classe. Posons $\mathcal{K}_n = \bigcup_0^n K_n$. Soit $f \in \text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y)$; notons $\Gamma_{C^k}^{\mathcal{K}_n}(f^*TY)$ l'ensemble des sections de classe C^k du fibré $f^*TY|_{\mathcal{K}_n}$. On a le système projectif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_{C^k}^{\mathcal{K}_n}(f^*TY) & \xleftarrow{i_k^n} & \Gamma_{C^{k-1}}^{\mathcal{K}_n}(f^*TY) \\ \downarrow i_{k-1}^{n-1} & & \searrow i_{k-1}^n \\ \Gamma_{C^{k-1}}^{\mathcal{K}_{n-1}}(f^*TY) & & \end{array}$$

$\Gamma_{C^\infty}^{\mathcal{K}_n}(f^*TY)$ en est la limite ; c'est un espace de Fréchet, limite projective d'une suite d'espaces de Banach (donc, en particulier, localement convexes, métrisables et complets). Un raisonnement analogue à celui du lemme 2.3' montre alors que les changements de cartes sont de classe D^∞ et $\text{Hom}_{\mathcal{D}^\infty}(X, Y)$ possède une structure de quasi-variété de classe D^∞ modélée sur cet espace de Fréchet.

Citons enfin le résultat suivant :

Théorème 2.5. : Soit f une immersion d'une variété Z dans une variété Y , toutes deux de classe C^{r+1} . Alors si :

- (i) X est compact,
- (ii) Y possède une fonction exponentielle de classe C^r ,
- (iii) la suite :

$$0 \longrightarrow TZ \longrightarrow f^*TY \longrightarrow \text{se fend ,}$$

$\text{Hom}_r(X, Z)$ est une sous-variété de $\text{Hom}_r(X, Y)$.

Ce résultat est valable même pour $r = \infty$ (confer le théorème 2.3. chapitre V).

TABLE DES MATIERES

	PAGES
INTRODUCTION	
CHAPITRE I : Notion de catégorie fermée.	1
CHAPITRE II : Notion de quasi-topologie et de différentiabilité dans la catégorie des espaces vectoriels quasi-topologiques. Applications de Classe D^r .	13
CHAPITRE III : Variétés de classe D^r et structures fibrées de même classe.	40
CHAPITRE IV : Structure de l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Y)$	49
CHAPITRE V : Suites exactes de fibrés vectoriels quasi-topologiques.	64
CHAPITRE VI : Applications - Structure de l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{F}^r}(X, Y)$ pour X compact.	72

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Abraham : Lectures of Smale on differential topology
- [2] Antoine Ph. : C.R. Académ. Sc. Paris t. 262 - p 1389 - 1392 (20 juin 1966).
- [3] Antoine Ph. : Bulletin de la société mathématique de Belgique -Tome XVIII - fascicule 2 - 1966. Etude élémentaire des catégories d'ensembles structurés. Première partie.
- [3] bis Antoine Ph. : Bulletin de la société mathématique de Belgique -Tome XVIII - fascicule 4 - 1966. Deuxième partie.
- [4] Bastiani A. : J. Anal. Math 13. (Jérusalem) p.2 - 113.
- [5] N. Bourlaki : topologie générale - Chapitre I.
- [6] " : espaces fonctionnels - Chapitre X
- [7] " : espaces vectoriels topologiques - Chapitre I et II
- [8] " : " " " " - Chapitre III-IV - V
- [9] Cartan H. : Séminaire de topologie différentielle - 14^{ème} année - 1961-1962
- [10] " " " " " " 15^{ème} année 1962 - 1963
- [10] Choquet G. : Annales de l'Université de Grenoble - 1947 - 1948 Convergences.
- [11] James Eells : A setting for global Analysis - 1967
- [12] Ehresmann : Séminaire de topologie et de géométrie différentielle - 1962.
- [13] Frölicher : Calculus in vector spaces without norm.
- [14] Morris W. Hirsch and Bang Mazur : Smoothing of piecewise manifolds .
- [15] Palais : From Letters of. R. Palais - nov.16 - 1962.
- [16] S. Lang : Introduction of differentiable manifolds - interscience.
- [17] E. Spanier : Duke math. J. 30, 1963 p 1-14.